

使用に際し、この説明書を必ず読むこと。また、必要なとき読めるよう大切に保管すること。

皮膚疾患外用薬

湿疹・皮膚炎・かゆみ・虫さされに

第2類医薬品

アネミンケア[®] クリーム

製品の特徴

アネミンケアは、かぶれや湿疹などの皮膚の炎症やかゆみを抑える、無着色・無香料のクリームです。殺菌成分配合により、同時に患部の雑菌による感染も防ぎます。のびが良くてべたつかず、赤ちゃんからお年寄りまで幅広く使用できます。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

1. 次の部位には使用しないこと。
 - 1) 水痘 (水ぼうそう)、みずむし・たむしなど又は化膿している患部。
 - 2) 目の周囲、粘膜等。
2. 顔面には、広範囲に使用しないこと。
3. 長期連用しないこと。



相談すること


1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - 1) 医師の治療を受けている人。
 - 2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 4) 患部が広範囲の人。
 - 5) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚 (患部)	みずむし・たむしなどの白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

効能効果

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん。




用法用量

1日1～3回適量を患部に塗布する。

〈用法用量に関連する注意〉

- 1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- 2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- 3) 外用にのみ使用すること。

〈チューブの穴の開け方〉



キャップを逆向きにし、中にある突起物をチューブの口に深く差し込み、穴を開けて下さい。

成分分量

100g中

成分	分量	はたらき
ヒドロコルチゾン酢酸エステル	0.5g	かぶれや湿疹などの赤みやはれ、かぶれを鎮めるおだやかなステロイドです。
グリチルレチン酸	0.2g	抗炎症作用により、はれを改善します。
トコフェロール酢酸エステル	0.5g	血行を改善します。
クロタミトン	5g	不快なかゆみを抑えます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	刺激の少ない殺菌消毒剤で、皮膚の雑菌による感染、かきこわしなどによる二次感染を防ぎます。

添加物としてパラフィン、ステアリン酸グリセリン、水添大豆リン脂質、カルボキシビニルポリマー、セトステアリアルコール、アジピン酸ジイソプロピル、1,3-ブチレングリコール、ポリオキシエチレンセチルエーテル、クエン酸水和物、ジイソプロパノールアミンを含有する。

保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
2. 小児の手のとどかない所に保管すること。
3. 他の容器に入れかえないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。
4. 表示の使用期限を過ぎたものは使用しないこと。


〔問い合わせ先〕

1. 購入した薬局・薬店
2. 日水製薬株式会社 お客さま相談窓口 電話：03-3837-0987
受付時間：午前10時～12時、午後1時～5時
(土・日・祝日を除く)

発売元

 **日水製薬株式会社**
東京都台東区上野3-23-9

製造販売元

 **ジャパンメディック株式会社**
富山県富山市横越168

副作用被害救済制度の問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html> ☎0120-149-931