

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

鎮痛消炎薬

第2類医薬品

つらい肩・腰の痛みに

パテックス® フェルビナク メントールローション

パテックス フェルビナク メントールローションの特徴

- フェルビナクは痛みに関する物質（プロスタグランジン）の生成をおさえ、肩・腰・関節・筋肉のつらい痛みにすぐれた効き目をあらわします。
- ローションタイプで、どこでも手軽に使えます。
- 広範囲に塗りやすい「ワイドヘッド」を採用しています。
- l-メントール3.0%配合で、「スーッ」と爽やかな使い心地です。



使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないで下さい。

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人
- (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (4) 15歳未満の小児

2. 次の部位には使用しないで下さい。

- (1) 目の周囲、粘膜等
- (2) しつしん、かぶれ、傷口
- (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声の かすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、 動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

■ 効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、打撲、捻挫、腱鞘炎（手・手首・足首の痛みと腫れ）、肘の痛み（テニス肘など）

■ 使用法

1日2~4回、適量を患部に塗布して下さい。

〈使用法に関する注意〉


- (1) 使用法を厳守して下さい。
- (2) 15歳未満の小児は使用しないで下さい。
- (3) 目に入らないよう注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けて下さい。
- (4) 外用にのみ使用して下さい。
- (5) 薬剤塗布後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないで下さい。

本品の容器は、塗布部に広口のスポンジキャップをつけた塗布容器です。

● キャップの開け方

矢印の方向へキャップを回して下さい。

開けにくい場合は、キャップの上から布等をかぶせて回すと開けやすくなります。



● 塗り方

スポンジ部分を、患部にあてながら塗り広げます。

- 最初にお使いになるときは、スポンジ部分を下にして患部にあて、薬液がスポンジにしみ込んでからお使い下さい。
- 薬液の出方が少ないとときは、スポンジ部分を下にして患部に押し付けるようにすると出てきます。
- キャップをしっかりと閉めないと薬液がもれことがありますので、注意して下さい。

■ 成分・分量

本剤は、無色～淡黄色澄明な液で、100mL中に次の成分を含有しています。

成 分	分 量	はたらき
フェルビナク	3.0g	炎症をおさえ、痛みをやわらげます。
l-メントール	3.0g	清涼感を与え、痛みをやわらげます。

添加物：エタノール、トリエタノールアミン、1,3-ブチレングリコール

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 火気に近づけないで下さい。
- (5) 本剤は化学繊維、プラスチック類、塗装面等を溶かしたりすることができますので、床、家具、メガネ等につかないようにして下さい。
- (6) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用して下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

電話 0120-337-336

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

05 ®登録商標



販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
Daiichi-Sankyo
東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元
ジャパンメディック株式会社
富山県富山市横越168