

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

2015年10月改訂

B1

かゆみ・虫さされに

第②類医薬品

# カユミック<sup>®</sup>AローションVII セブン

鎮痒消炎薬

## カユミックAローションVIIの特徴

- ・液体タイプで、スースとここちよい清涼感を与えます。
- ・首の部分が曲がっていて、塗りにくい患部にもスポンジがピッタリと接し、手を汚さずに塗布できます。
- ・抗炎症成分(デキサメタゾン酢酸エステル、グリチルレチン酸)により、虫さされ等によるはれ・赤みを改善し、かゆみ止め成分(ジフェンヒドラミン塩酸塩、リドカイン)により、かゆみをすばやく鎮めます。
- また、殺菌成分(イソプロピルメチルフェノール)が搔き壊した患部の雑菌の繁殖を抑え、症状の悪化を防ぎます。

## ⚠ 使用上の注意



### してはいけないこと

〈守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります〉

1. 次の部位には使用しないでください。
  - (1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部
  - (2)目の周囲、粘膜等
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください。
3. 長期連用しないでください。



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1)医師の治療を受けている人
  - (2)妊娠又は妊娠していると思われる人
  - (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (4)患部が広範囲の人
  - (5)湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。


関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮ふ(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

裏面も必ずお読みください

## 効能・効果

虫さされ、かゆみ、湿疹、皮ふ炎、かぶれ、じんましん、あせも、しもやけ



## 用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

### 〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 定められた用法・用量をお守りください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 本剤にはアルコールが含有されているため、塗布した時にしみることがあります。
- (5) 本剤のついた手で、目など粘膜にふれないでください。
- (6) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (7) 使用する際は、スポンジ部分をゆっくり患部に数回押し当て、スポンジに薬液を十分しみ込ませてから塗布してください。(スポンジ面に薬液が十分しみ込んでいない状態で使用すると、スポンジが破損する場合があります。)  
また、スポンジ面に薬液をしみ込ませても、強く押し当てたまま塗布しますと、スポンジが破損する原因になりますのでご注意ください。



※暑い時期など、内圧が高まり、薬液が多く出ることがありますので、ご使用前に、キャップを開けて容器を立てたまま、スポンジ部分を数回押してください。

## 成分・分量

成 分	含 量 (100mL中)	は たら き
デキサメタゾン酢酸エステル	0.025 g	炎症を抑え、はれ・赤み等の症状を改善します。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	1.0 g	抗ヒスタミン作用により、虫さされ等に伴うかゆみや炎症を抑えます。
グリチルレチン酸	0.3 g	炎症を鎮めます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1 g	患部の雑菌の繁殖を抑え、症状の悪化を防ぎます。
リドカイン	0.5 g	局所麻酔作用により、かゆみをすばやく鎮めます。
dl-カンフル	2.0 g	
l-メントール	3.5 g	清涼感を与え、かゆみをすばやく鎮めます。

添加物：1,3-ブチレングリコール、酒石酸、イソプロパノール、エタノール

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 使用後は、速やかにキャップを十分にしめて、直射日光の当たらない涼しい所に立てて保管してください。(保管方法を守らないと、塗布部のスポンジ破損の原因になったり、液漏れにつながる恐れがあります。)
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 火気には近づけないでください。
- (5) 時計、めがね等の金属類、プラスチック類、化学繊維類、皮革製品、塗装のしてある床・家具等に付着すると変質することがありますので、付着しないよう注意してください。
- (6) 衣類に付着した場合は、なるべく早く水又は洗剤で洗ってください。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



### 製品についてのお問い合わせ

- ・お買い求めの販売店
- ・ノーエチ薬品株式会社 お客様相談室：072-331-0417
- 受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独) 医薬品医療機器総合機構  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

発売元

**ノーエチ薬品株式会社**

大阪府松原市高見の里4丁目8番16号

製造販売元

**ジャパンメディック株式会社**

富山県富山市横越168