

鎮痒消炎薬

第2類医薬品

# 気になる部分の炎症・かゆみに デリケーションクール 40g

## 特徴

- デリケートな部分(股間や内股、脇、首など)のかゆみを鎮めます。
- ステロイドを使用していない、爽快感のあるクリームタイプのお薬です。
- かゆみのもととなる物質の作用を抑え、不快なかゆみを抑えます。
- かゆみや炎症の原因となっている雑菌の繁殖を抑え、皮ふを清潔に保ちます。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人

(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

(3) 湿潤やただれのひどい人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤・かゆみ・はれ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## <早く治すためのポイント>

- かゆみを引き起こす原因是、汗やムレ、乾燥、衣類や下着などの繊維製品の擦れなどです。まずはかゆみの原因を取り除き、患部を清潔に保ち、お薬を塗ってください。
- 5~6日間塗り続けても一向にかゆみが治まらない場合は、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

※男性のデリケートな部分のかゆみと言えばいんきんたむしを疑いがちですが、陰のうのかゆみは、ほとんどの場合いんきんたむしが原因ではありません。

■クール感がお好みの方におすすめいたします。

ご使用に際して、この箱の説明文書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

## 効能・効果

かゆみ、かぶれ、あせも、ただれ、湿疹、皮ふ炎、じんましん、虫さされ、しもやけ

## 用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

<用法・用量に関する注意>

- (1) 定められた用法・用量をお守りください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 粘膜部分には使用しないでください。

## 成分・分量 (100g中)

リドカイン ..... 2.0g (かゆみを鎮める)

ジフェニヒドラミン塩酸塩 ..... 2.0g (かゆみのもととなるヒスタミンの働きを抑える)  
イソプロピルメチルフェノール ..... 0.1g (雑菌の繁殖を抑える)

トコフェロール酢酸エステル ..... 0.3g (血流を良くし、患部の回復を早める)  
l-メントール ..... 0.5g (清涼感を与える、かゆみを鎮める)

添加物として、モノステアリン酸グリセリン、ベヘニルアルコール、セトステアリルアルコール、パルミチン酸セチル、ミリスチン酸ミリストチル、パルミチン酸イソプロピル、軽質流動パラフィン、ジメチルポリシロキサン、ボリオキシチレンボリオキシプロビレンセチルエーテル、1,3-ブチレンリコール、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物を含有します。

## 保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売元

ジャパンメディック株式会社

富山県富山市横越168

お客様相談窓口 ☎ 076-438-1107  
受付時間：月～金(祝祭日・年末年始を除く) 9:00～17:00

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931