



### 相談すること

#### 使用上の注意

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

効能・効果 かゆみ、虫さされ、皮膚炎、かぶれ、じんましん、湿疹、あせも

用法・用量 1日数回、適量を患部に塗布してください。

＜用法・用量に関連する注意＞ 1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。2. 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。3. 外用にのみ使用してください。4. 何度もこするとボロボロとジェルがはがれることがありますので、患部に薄く塗布してください。5. 使用後は必ずキャップをしっかりと閉じ、キャップをしめないと、ジェルが固まってチューブの穴が詰まり、出にくくなる可能性があります。

ご使用に際して、この箱の説明書を必ずお読みください。また、必要時に読めるよう大切に保管してください。

セルフメディケーション

税 控除 対象

C+MEDI

湿疹・  
じんましんに

非ステロイド

鎮痒消炎薬

ANTIPRURITIC AND ANTI-INFLAMMATORY

ひんやり  
ジェル

ジフェンヒドラミン塩酸塩2.0%

かゆみ 虫さされ 皮膚炎 かぶれ

じんましん 湿疹 あせも

ノピカンテかゆみジェルm

第3類医薬品

1日数回、適量を  
患部に塗布

20g

成分・分量(100g中) ジフェンヒドラミン塩酸塩 2.0g、グリチルレチン酸 0.2g、  
L-メントール 5.0g、dl-カンフル 1.0g 添加物: 1,3-ブチレングリコール、濃グリセリン、ヒプロメロース、疎水化ヒドロキシプロピルセルロース、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、エタノール※本剤はアルコールを含んでおりますので、傷口等に塗布するとしみる場合があります。※ステロイド無配合のジェルです。

保管及び取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる恐れがあります。)(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売元

ジャパンメディック株式会社  
富山県富山市横越168

[C+MEDI]は、コスモス薬品の  
プライベートブランドです。

お客様相談窓口 ☎076-438-1107  
受付時間: 月～金 9:00～17:00  
(祝日・年末年始を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



セルフメディケーション

税 控除 対象

C+MEDI

虫さされ・  
かゆみに

非ステロイド

鎮痒消炎薬

ANTIPRURITIC AND ANTI-INFLAMMATORY

ひんやり  
ジェル

ジフェンヒドラミン塩酸塩2.0%

かゆみ 虫さされ 皮膚炎 かぶれ

じんましん 湿疹 あせも

ノピカンテかゆみジェルm

第3類医薬品

1日数回、適量を  
患部に塗布

20g