

かゆみ・虫さされに ハイカユミーNIジェル

鎮痒消炎薬

〔ハイカユミーNIジェルの特徴〕

- ゲルタイプで、スーッとこちよい清涼感を与えます。
- かゆみや炎症を抑える成分として、デキサメタゾン酢酸エステル、グリチルレチン酸を配合しています。
- かゆみを抑える成分として、*l*-メントール、*dl*-カンフルを配合しています。
- 殺菌作用のある成分として、イソプロピルメチルフェノールを配合しています。



使用上の注意



してはいけないこと

＜守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります＞

1. 次の部位には使用しないでください。
(1) 水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部
(2) 目の周囲、粘膜等
2. 顔面には広範囲に使用しないでください。
3. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(4) 患部が広範囲の人
(5) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔*効能・効果〕

かゆみ、虫さされ、かぶれ、あせも、じんましん、湿疹、皮ふ炎、しもやけ



〔用法・用量〕

1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関する注意〉

1. 定められた用法・用量をお守りください。
2. 小児に使用させる場合には特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
3. 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状の重い場合には眼科医の診療を受けてください。
4. 患部を搔かないでください。本剤にはアルコールが含有されているため、塗布した時にしみる場合があります。
5. 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

〔成分・分量〕

成分	含量 (100g中)	はたらき
デキサメタゾン酢酸エステル	0.025g	炎症を抑え、はれ・赤み等の症状を改善します。
グリチルレチン酸	0.3g	虫さされなどによる炎症を抑えます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	患部に対する殺菌作用があります。
l-メントール	3.0g	鎮痛作用を有し、清涼感のある刺激作用により痛みやかゆみをやわらげます。
dl-カンフル	2.0g	

添加物：カルボキシビニルポリマー、ヒプロメロース、ジイソプロパノールアミン、イソプロパノール、エタノール

〔保管及び取扱い上の注意〕

1. 使用後は、必ずキャップをきちんと閉めてください。車の中など高温になる場所や、直射日光の当たる場所を避け、涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
4. 火気に近づけないでください。
5. 時計、めがね等の金属類、化学繊維の衣類、プラスチック類、塗装のしてある床・家具等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
6. 衣類や寝具に付着した場合は、なるべく早く水又は洗剤で洗ってください。
7. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製品についてのお問い合わせ

- お買い求めの販売店
- ジャパンメディック株式会社 お客様相談窓口：076-438-1107
(受付時間：月～金（祝祭日・年末年始を除く）9：00～17：00)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)