

第2類医薬品

デリケートな部分のかゆみどめに フィーディアクール

鎮痒消炎薬

特 徴


- デリケートな部分（股間や内股、脇、首など）のかゆみを鎮めます。
- ステロイドを使用していない、爽快感のあるクリームタイプのお薬です。
- かゆみのもととなる物質の作用を抑え、不快なかゆみを抑えます。
- かゆみや炎症の原因となっている雑菌の繁殖を抑え、皮ふを清潔に保ちます。

早く治すためのポイント

- かゆみを引き起こす原因は、汗やムレ、乾燥、衣類や下着などの繊維製品の擦れなどです。まずはかゆみの原因を取り除き、患部を清潔に保ち、お薬を塗ってください。5～6日間塗り続けても一向にかゆみが治まらない場合は、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

※男性のデリケートな部分のかゆみと言えはいんきんたむしを疑いがちですが、陰のうのかゆみは、ほとんどの場合いんきんたむしが原因ではありません。

クール感がお好みの女性の方にもお使いいただけます。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 湿潤やただれのひどい人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

かゆみ、かぶれ、あせも、ただれ、湿疹、皮ふ炎、じんましん、虫さされ、しもやけ



用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量をお守りください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診察を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 粘膜部分には使用しないでください。

成分・分量

成分	含量 (100g中)	はたらき
リドカイン	2.0g	局所麻酔作用により、かゆみを鎮めます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.0g	かゆみのもととなる物質(ヒスタミンなど)を抑えます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌作用により、患部の雑菌の発生を抑えます。
トコフェロール酢酸エステル	0.3g	血行促進作用により、荒れた患部の回復を促進します。
l-メントール	0.5g	清涼感を与え、かゆみを鎮めます。

添加物として、モノステアリン酸グリセリン、ベヘニルアルコール、セトステアリルアルコール、パルミチン酸セチル、ミリスチン酸ミリスチル、パルミチン酸イソプロピル、軽質流動パラフィン、ジメチルポリシロキサン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル、1,3-ブチレングリコール、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製品についてのお問い合わせ

- ・お買い求めの販売店
- ・ジャパンメディック株式会社 お客様相談窓口:076-438-1107
〔受付時間:月～金(祝祭日・年末年始を除く)9:00～17:00〕

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

発売元
株式会社プロダクト・イノベーション
富山県富山市浜黒崎239番地

製造販売元
ジャパンメディック株式会社
富山県富山市横越168