

肩こりに伴う肩の痛み・腰痛・関節痛・筋肉痛に

リズミカルシンW

外用鎮痛消炎薬

〔特徴〕

- ・ リズミカルシンWは、医療用でも使われている非ステロイド性鎮痛消炎成分のインドメタシンを1%配合しております。
- ・ インドメタシンは、塗布部位への吸収性に優れ、皮ふから肩、腰、関節などの痛みのある部分に直接浸透し、痛みの原因となる物質の生成を抑え、炎症を鎮めてつらい症状に効果を発揮します。
- ・ l-メントールの配合により、心地よい清涼感があり、痛みをやわらげます。
- ・ 首の部分が曲がっていて、ラバーがピッタリと接しますので、背中や腰などの塗りにくい患部にもスムーズにむらなく適量を塗布できます。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (2) ぜんそくを起こしたことがある人
2. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 目の周囲、粘膜等
 - (2) 湿疹、かぶれ、傷口
 - (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部
3. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-------------------------------|
| 皮ふ | 発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感 |

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔効能・効果〕

肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、腰痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫(ねんざ)

〔用法・用量〕

1日4回を限度として適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 11歳以上15歳未満の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 11歳未満の小児に使用させないでください。
- (4) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (5) 本剤のついた手で、目など粘膜にふれないでください。
- (6) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (7) 1週間あたり50mLを超えて使用しないでください。
- (8) 皮ふの弱い人は、同じところに続けて塗布しないでください。
- (9) 本剤を塗った後の患部を通気性の悪いものでおおわないでください。
- (10) 入浴前後にご使用になった場合、強い刺激(ヒリヒリする等)を感じる場合があります。この場合はすぐに石けん又はぬるま湯で洗い流してください。
- (11) スポンジ面をゆっくり患部に数回押し当て、スポンジに薬液を十分しみ込ませてから患部に塗布してください。薬液をスポンジ面にしみ込ませないで使用すると、スポンジが破損する場合があります。また、スポンジ面に薬液をしみ込ませても、強く押し当てたまま塗布しますと、スポンジが破損する原因になりますのでご注意ください。



〔成分・分量〕

100g中に次の成分を含んでいます。

| 成分 | 含量 |
|---------|------|
| インドメタシン | 1.0g |
| l-メントール | 3.0g |

添加物として、ベンジルアルコール、プロピレングリコール、ヒプロメロース、BHT、クエン酸水和物、ジインプロパノールアミン、亜硫酸水素Na、アジピン酸ジインプロピル、イソプロパノール、エタノールを含有します。

〔保管及び取り扱い上の注意〕

- (1) 使用後は、必ずキャップを十分にしめて、直射日光の当たらない涼しい所に立てて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさげ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 時計、めがね等の金属類、化学繊維の衣類、プラスチック類、塗装のしてある床・家具等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (6) 衣類に付着した場合は、なるべく早く水又は洗剤で洗ってください。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製品についてのお問い合わせ

- お買い求めの販売店
- ジャパンメディック株式会社 お客様相談窓口：076-438-1107
〔受付時間：月～金（祝祭日・年末年始を除く）9：00～17：00〕

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

発売元
株式会社アシスト

製造販売元
ジャパンメディック株式会社
富山県富山市横越168