

ご使用に際して、この箱の説明文書必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

販売名: コリコングα **第3類医薬品**

外用鎮痛消炎剤

特徴

1 つらい肩こり、腰痛に

鎮痛消炎、血行促進、抗炎症の3つの作用で、肩こりや腰痛を緩和します。

2 微香性

ニオイを気にせず使えます。

3 塗布しやすい構型ボトル

首の部分が曲がっているので、背中や腰にもスムーズにむらなく適量を塗布できます。

使用上の注意

※してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口

※相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。


用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

《用法・用量に関連する注意》

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 本剤のついた手で、目など粘膜にふれないでください。
- (5) 外用にのみ使用してください。
- (6) 入浴前後の使用は避けてください。
- (7) 塗布した患部をコタツや電気毛布などで温めないでください。
- (8) 塗布した患部を通気性の悪いものでおおわないでください。
- (9) 入浴時や、汗をかいた時に、強い刺激を感じる場合があります。その場合は、患部をこすらず、よく泡立てた石けんで数回洗い、その後冷水などで十分に冷やしてください。症状が改善しない場合は、この箱を持って医師に相談してください。
- (10) 皮膚の弱い人は、同じところに続けて塗布しないでください。

- (11) スポンジ面をゆっくりに患部に数回押し当て、スポンジに薬液を十分しみ込ませてから患部に塗布してください。薬液をスポンジ面にしみ込ませないで使用する時、スポンジが破損する場合があります。



税 控除 対象

開封口

3種の有効成分配合

ローション
50mL

肩こり・腰痛 筋肉痛に

鎮痛消炎成分

サリチル酸グリコール
l-メントール

血行促進成分

ノナン酸バニリルアミド
ニコチン酸ベンジルエステル

抗炎症成分

グリチルレチン酸
クロルフェニラミンマレイン酸塩

コリコングα

第3類医薬品

成分・分量 (100g中)

サリチル酸グリコール…………… 3.0g
l-メントール…………… 3.0g
クロルフェニラミンマレイン酸塩… 0.1g
グリチルレチン酸…………… 0.05g
ノナン酸バニリルアミド…………… 0.015g
ニコチン酸ベンジルエステル… 0.02g
添加物:ヒプロメロース、プロピレングリコール、アジピン酸ジイソプロピル、エタノール

効能・効果

肩こり、腰痛、関節痛、筋肉疲労、打撲、筋肉痛、ねんざ

保管及び取扱い上の注意

- (1) 使用後は、必ずキャップを十分に閉めて、直射日光の当たらない涼しい所に立てて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わってしまうことがあります。)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 時計、めがね等の金属類、化学繊維の衣類、プラスチック類、塗装のある床・家具等にも付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (6) 衣類に付着した場合は、なるべく早く水又は洗剤で洗ってください。
- (7) 使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売元

ジャパンメディック株式会社
富山県富山市横越168

お客様相談窓口 ☎076-438-1107
受付時間: 9:00~17:00
月~金(祝日・年末年始を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先
☎0120-149-931(フリーダイヤル)

品目番号36-256

