

第②類医薬品

かゆみ・虫さされに

ムシクールS

鎮痒消炎薬

ムシクールSの特徴

- ・*l*-メントールと*dl*-カンフルが、スーッとこちよい清涼感を与えます。
 - ・首の部分が曲がっていて、塗りにくい患部にもスポンジがピッタリと接し、手を汚さずに塗布できます。
 - ・抗炎症成分(デキサメタゾン酢酸エステル、グリチルレチン酸)が、虫さされ等によるはれ・赤みを改善し、かゆみ止め成分(ジフェンヒドラミン塩酸塩)が、かゆみをすばやく鎮めます。
- また、殺菌成分(イソプロピルメチルフェノール)が掻き壊した患部の雑菌の繁殖を抑え、症状の悪化を防ぎます。



使用上の注意



してはいけないこと

〈守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります〉

1. 次の部位には使用しないでください。
 - (1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部
 - (2)目の周囲、粘膜等
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください。
3. 長期連用しないでください。



相談すること


1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4)患部が広範囲の人
 - (5)湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

虫さされ、かゆみ、湿疹、皮ふ炎、かぶれ、じんましん、あせも、しもやけ




用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- 定められた用法・用量をお守りください。
 - 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
 - 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
 - 本剤にはアルコールが含有されているため、塗布した時にしみることがあります。
 - 本剤のついた手で、目など粘膜にふれないでください。
 - 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
 - 使用する際は、スポンジ部分をゆっくり患部に数回押し当て、スポンジに薬液を十分しみ込ませてから塗布してください。（スポンジ面に薬液が十分しみ込んでいない状態で使用すると、スポンジが破損する場合があります。）
また、スポンジ面に薬液をしみ込ませても、強く押し当てたまま塗布しますと、スポンジが破損する原因になりますのでご注意ください。
- ※暑い時期など、内圧が高まり、薬液が多く出ることがありますので、ご使用前に、キャップを開けて容器を立てたまま、スポンジ部分を数回押ししてください。




成分・分量

成分	含量 (100mL中)	はたらき
デキサメタゾン酢酸エステル	0.025 g	炎症を抑え、はれ・赤み等の症状を改善します。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.0 g	抗ヒスタミン作用により、虫さされ等に伴うかゆみや炎症を抑えます。
グリチルレチン酸	0.5 g	炎症を鎮めます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1 g	患部の雑菌の繁殖を抑え、症状の悪化を防ぎます。
dl-カンフル	3.0 g	清涼感を与え、かゆみをすばやく鎮めます。
l-メントール	5.0 g	

添加物：クエン酸、クエン酸Na、プロピレングリコール、イソプロパノール

保管及び取扱い上の注意

- 使用後は、速やかにキャップを十分に締め、直射日光の当たらない涼しい所に立てて保管してください。（保管方法を守らないと、塗布部のスポンジ破損の原因になったり、液漏れにつながる恐れがあります。）
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わります。）
- 火気に近づけないでください。
- 時計、めがね等の金属類、プラスチック類、化学繊維類、皮革製品、塗装のしたる床・家具等に付着すると変質することがありますので、付着しないよう注意してください。
- 衣類に付着した場合は、なるべく早く水又は洗剤で洗ってください。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



製品についてのお問い合わせ

- ・お買い求めの販売店
- ・ジャパンメディック株式会社 お客様相談窓口：076-438-1107
〔受付時間：月～金（祝日・年末年始を除く）9:00～17:00〕

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元
ジャパンメディック株式会社
富山県富山市横越168