

肩・腰・ひざ

痛みに

パテックス® 液 ID

インドメタシン配合

冷感、効く!

40mL

パテックス
液 ID
肩・腰・ひざの痛み
に効く
インドメタシン配合
40mL
第一三共ヘルスケア

広範囲に塗れる
【首曲がりタイプ】

【特納用】第2類医薬品

使用法


1日4回を限度として適量を患部に塗布して下さい。

<使用法に関連する注意>

- (1) 使用法を厳守して下さい。
- (2) 11歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3) 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- (4) 外用にのみ使用して下さい。
- (5) 使用部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないで下さい。
- (6) 1週間あたり50mLを超えて使用しないで下さい。

【容器の使い方】

スポンジ面を下にしてゆっくり患部に数回押しあて、スポンジに薬液を十分浸透させてから使用して下さい。



保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 火気に近づけないで下さい。
- (5) 本剤は化学繊維、プラスチック類、塗装面等を溶かしたりすることがありますので、床、家具、メガネ等につかないようにして下さい。
- (6) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。



Daiichi-Sankyo

開封口

使用前にこの箱の説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要に応じて読めるよう大切に保管して下さい。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないで下さい。
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (2) ぜんそくを起こしたことがある人
 - (3) 11歳未満の小児
2. 次の部位には使用しないで下さい。
 - (1) 目の周囲、粘膜等
 - (2) しっしん、かぶれ、傷口
 - (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部
3. 長期連用しないで下さい。

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性ありますので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

成分・分量

本剤は、黄色澄明な液で、100g中に次の成分を含有しています。

成 分	分量	はたらき
インドメタシン	1.0g	炎症をおさえ、痛みをやわらげます。
l-メントール	3.0g	清涼感をあたえ、痛みをやわらげます。

添加物：アジピン酸ジソプロピル、イソプロパノール、BHT、亜硫酸水素Na、ベンジルアルコール、トリエタノールアミン、クエン酸

鎮痛消炎薬 40mL

パテックス液ID

第2類医薬品

効能・効果

筋肉痛、関節痛、腰痛、腱鞘炎(手・手指の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫、肩こりに伴う肩の痛み

販売元

第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元

ジャパンメディック株式会社
富山県富山市横越168

本品についてのお問い合わせは、下記にお願い致します。
第一三共ヘルスケア株式会社
お客様相談室
〒103-8234
東京都中央区日本橋3-14-10
電話 0120-337-336
受付時間 9:00~17:00
(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

MADE IN JAPAN



火気厳禁 第二石油類
水溶性危険等級Ⅲ

02®登録商標



Daiichi-Sankyo

第一三共ヘルスケア