



管理コード
512072A1



デリケート部分の炎症・かゆみに 鎮痒消炎薬

デリナースクール



日常医療のオンラインプラットフォーム

QRコードから詳しい製品情報にアクセスしたり、お薬について薬剤師に相談できるアフターサポートも提供しています。
URL : <https://minacolor.com/>



⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 湿潤やただれのひどい人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【特徴】

- デリケートな部分（股間や内股、脇、首など）のかゆみを鎮めます。
- ステロイドを使用していない、爽快感のあるクリームタイプのお薬です。
- かゆみのもととなる物質の作用を抑え、不快なかゆみを抑えます。
- かゆみや炎症の原因となっている雑菌の繁殖を抑え、皮ふを清潔に保ちます。
- クール感がお好みの女性の方にもお使いいただけます。

【効能・効果】

かゆみ、かぶれ、あせも、ただれ、湿疹、
皮ふ炎、じんましん、虫さされ、しもやけ

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布してください。

● 用法・用量に関連する注意

- 定められた用法・用量をお守りください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。
- 粘膜部分には使用しないでください。

【成分・分量】

成分	分量(100g中)	はたらき
リドカイン	2.0g	局所麻酔作用により、かゆみを鎮めます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.0g	かゆみのもととなる物質(ヒスタミンなど)を抑えます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌作用により、患部の雑菌の繁殖を抑えます。
トコフェロール酢酸エステル	0.3g	血行促進作用により、荒れた患部の回復を促進します。
l-メントール	0.5g	清涼感を与え、かゆみを鎮めます。

添加物として、モノステアリン酸グリセリン、ベヘニルアルコール、セトステアリルアルコール、パルミチン酸セチル、ミリスチン酸ミリスチル、パルミチン酸イソプロピル、軽質流動パラフィン、ジメチルポリシロキサン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル、1,3-ブチレングリコール、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物を含有します。

● 保管及び取扱い上の注意

- 1.直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 2.小児の手の届かない所に保管してください。
- 3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- 4.使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

● 早く治すためのポイント

かゆみを引き起こす原因は汗やムシ、乾燥、衣類や下着などの繊維製品の擦れなどです。

まずはかゆみの原因を取り除き、患部を清潔に保ち、お薬を塗ってください。

5～6日間塗り続けても一向にかゆみが治まらない場合は、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

※男性のデリケート部分のかゆみと言えはいんきんたむしを疑いがちですが、陰のうのかゆみは、

ほとんどの場合いんきんたむしが原因ではありません。

製品についてのお問い合わせ先

株式会社ミナカラ お客様相談窓口

☎ 03-5544-8440

受付時間: 10:00-17:00

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

☎ 0120-149-931

販売元:

ミナカラ薬局 (+ minacolor inc.)

〒101-0047 東京都千代田区内神田3丁目18-3 SDビル4階

<https://minacolor.com/>

製造販売元:

ジャパンメディック株式会社

〒931-8412 富山県富山市横越168