

表面に
ぬり薬の豆知識も
あるよ!



ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

湿疹、皮ふ炎治療薬

ホームメディックレガート

第2類医薬品



管理コード
512089A1

製品特徴

- デリケートな部分(股間や内股、脇、首など)のかゆみを鎮めます。
- ステロイドを使用していない、爽快感のあるクリームタイプのお薬です。
- かゆみのもととなる物質の作用を抑え、不快なかゆみを抑えます。
- かゆみや炎症の原因となっている雑菌の繁殖を抑え、皮ふを清潔に保ちます。

△ 使用上の注意



相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3)湿潤やただれのひどい人
- 2.使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 3.5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

かゆみ、かぶれ、あせも、ただれ、湿疹、皮ふ炎、じんましん、虫さされ、しもやけ



湿疹、皮ふ炎

あせも、じんましん

かぶれ、ただれ、かゆみ

虫さされ

しもやけ

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1)定められた用法・用量をお守りください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないようご注意ください。
万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)粘膜部分には使用しないでください。

成分・分量

成分	分量(100g中)	はたらき
リドカイン	2.0g	局所麻酔作用により、かゆみを鎮めます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.0g	かゆみのもととなる物質(ヒスタミンなど)を抑えます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	患部を殺菌消毒します。
トコフェロール酢酸エステル	0.3g	血行を促進し、患部の回復を早めます。
l-メントール	0.5g	清涼感を与え、かゆみを鎮めます。

添加物: モノステアリン酸グリセリン、ベヘニルアルコール、セトステアリルアルコール、パルミチン酸セチル、ミリスチン酸ミリスチル、パルミチン酸イソプロピル、軽質流動パラフィン、ジメチルポリシロキサン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル、1,3-ブチレンジグリコール、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

ぬり薬の豆知識

Q

かゆみを抑える抗炎症治療薬と保湿剤、同時に使うときはどっちを先に塗ったらいいの？

A

保湿剤

抗炎症治療薬



この順で塗るのがオススメ!

抗炎症治療薬を先に塗ると、患部以外の皮膚にもお薬が広がってしまいます。保湿剤のあとに、抗炎症治療薬を塗りましょう。

※医師の指示がある場合は、その順序に従ってください。



お問い合わせ先

お客様
相談窓口



076-438-1107

受付
時間

月～金 9:00～17:00
(祝日・年末年始を除く)

製造販売元: ジャパンメディック株式会社
富山県富山市横越168