

この添付文書は、本剤の使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

メディピュア[®]CR

クールクリーム

販売名：メディピュアCR

第2類医薬品 鎮痒消炎薬

デリケートエリアは皮膚が薄く少しの刺激やアレルギー反応などによってかゆみが起こりやすい部位です。メディピュアCRは、リドカインとジフェンヒドラミン塩酸塩がかゆみを鎮め、イソプロピルメチルフェノールが雑菌の繁殖を抑え、デリケートエリアを清潔に保ちます。ノンステロイドで ℓ -メントールの清涼感がある伸びの良いクリーム剤です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効 能 かゆみ、かぶれ、あせも、ただれ、湿疹、皮膚炎、じんましん、虫さされ、しもやけ

用法・用量 1日数回、適量を患部に塗布してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 粘膜部分には使用しないでください。

成分 (100g中)

成 分	含 量	は た ら き
リドカイン	2.0g	局所麻酔作用により、かゆみを鎮めます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.0g	かゆみのもととなる物質（ヒスタミンなど）を抑えます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌作用により、患部の雑菌の繁殖を抑えます。
トコフェロール酢酸エステル	0.3g	血行促進作用により、荒れた患部の回復を促進します。
ℓ -メントール	0.5g	清涼感を与え、かゆみを鎮めます。

添加物：モノステアリン酸グリセリン、ベヘニルアルコール、セトステアリルアルコール、パルミチン酸セチル、ミリスチン酸ミリスチル、パルミチン酸イソプロピル、軽質流動パラフィン、ジメチルポリシロキサン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル、1,3-ブチレングリコール、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



販売元

田辺ファーマ株式会社

大阪市中央区道修町3-2-10

製造販売元

シャパンメディック株式会社

富山県富山市横越168

本品のお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願いいたします。

田辺ファーマ株式会社「くすり相談センター」

(フリーダイヤル 0120-54-7080)

受付時間：弊社営業日の9:00～17:30