

この添付文書は、お薬とともに保管し、ご使用の際には、必ずお読みください。

# 皮膚疾患治療剤 パーカーフェン「コジマ」

パーカーフェン「コジマ」は、皮膚病になったり、あせもが出来たりすると、とかくかゆくなりがちですが、そのかゆみや炎症をしめるために、下記の成分を配合した皮膚病薬です。

## (成分と作用)

《パーカーフェン「コジマ」》は白色の軟膏で1g中の成分及び作用は次の通りです。

ヒドロコルチゾン酢酸エステル	5mg	はれ、発赤、かゆみなど炎症症状を改善します。
ジフェンヒドラミン	5mg	かゆみをしめる抗ヒスタミン剤です。
チアントール	50mg	皮膚寄生虫および糸状菌に対して発育阻止作用があります。
アミノ安息香酸エチル	10mg	痛みやかゆみを止めます。
酸化亜鉛	362mg	皮膚の表面を保護します。
添加物としてミツロウ、ゴマ油、バレイショデンブンを含有する。		

## (効能・効果)

あせも、かゆみ止

## (用法・用量)

1日2～3回患部に適量を塗布するか又はガーゼにのばして貼付する。

## (用法及び用量に関する注意)

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3) 外用にのみ使用すること。

## ⚠(使用上の注意)

### してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

1. 次の部位には使用しないこと。  
水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部
2. 顔面には、広範囲に使用しないこと。
3. 長期運用しないこと。



### 相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (4) 患部が広範囲の人。
  - (5) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚 (患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

### (保管及び取扱い上の注意)

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

包装 500g

お問い合わせ先

《お客様相談室》

**052-913-2222**

製造販売元 **名旭製薬株式会社**

名古屋市北区大曾根三丁目1番33号

発 売 元 **合資会社コジマ薬局**

名古屋市北区大曾根三丁目4番12号