

家 伝 薬

第3類医薬品

速^{そく}治^ち膏^{こう}




速治膏は説明書を良く読んで使用して下さい。使用法を間違えると効果が減少します。
速治膏が固まっていたら最初良く、くずしてから練り合せないとむらが出来ます。

適 応 症

骨折、捻挫、脱臼、打撲傷、筋の痛み、関節炎、神経痛、リウマチス、肋間神経痛、腰の痛み、肩のこり、しもやけ。

使 用 法



- ①速治膏の封を切り、患部に適した分量を湯のみ茶わん等の容器に入れます。
※患部10cm四方位に大サジ山盛約1杯
- ②卵の白身だけを少しずつ入れながらはでゆっくりと練り合わせます。
- ③はしの先にかけてタリとたれない程度の固さに十分よく練り合わせて下さい。
- ④障子紙などの引の強い紙に10円硬貨位の厚さにのばして、患部に貼って下さい。

速治膏は貼付したら、はげないように包帯をして24時間貼付して下さい。
包帯ができない場合は、固定粘着シート等で止めて下さい。

- ★速治膏は使用前に患部を良くもみ、関節部は屈伸運動を5～10回行なって下さい。
- ★速治膏は乾燥するに従って痛みを伴う熱をとり、また乾燥後も其の薬効成分が、皮膚より患部に浸透しハレや痛みを鎮め効果が持続します。24時間は貼らないように使用して下さい。但し其の内にはげたら貼りかえて下さい。
- ★速治膏を使用すれば患部に青黒いあざのような物が現れますが、これは痛みがとれ痛みがなくなるにつれ、また使用を中止すれば4～5日位で消えてしまいます。

成分及び分量 (100g 中)

日局	サンシシ	16.2%	日局	オウバク末	4.5%
日局	ケイヒ末	4.5%	日局	カンフル	0.3%
日局	乾燥硫酸アルミニウムカリウム				0.7%

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。
次の部位には使用しないで下さい。

- (1) 目の周囲、粘膜など (2) 湿疹、かぶれ、傷口



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
今までに薬や化粧品などによるアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれなど）を起こしたことがある人。
- 使用中又は使用後に次のような症状があらわれた場合には、使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
発疹・発赤、かゆみ、ハレなど

その他の注意

- 使用中にかぶれたら一時使用を中止し、其れが治ってから、また使用を再開して下さい。
- 速治膏を患部に使用中は湯・水に湿すと効果がなくなりますので、入浴や患部を洗う場合は交換の際行って下さい。
- 使用中急性の疾患（骨折・脱臼・捻挫・打撲傷等）で内部炎症やハレが激しい場合は乾燥して激しく喰い付いて痛みを起こすことがありますので、其の時は効果は少々減りますが、2～3日位、1日2回貼りかえますと、熱やハレが取れて定時間使用できるようになります。
- 速治膏を小児に使用される場合は、保護者の監督のもとに使用して下さい。
※練り置きが出来たら、空気が入らぬようにラップ等で密封して置けば、翌日それに練り加えて使用出来ます。

◆慢性の痛みには、のみ薬神農湯を併用になれば、効力を増し、全治を促進します。

保管上の注意

- (1) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (2) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密封して保管して下さい。
- (3) 誤用をさけ品質を保持するため、他の容器に入れ替えないで下さい。
- (4) 開封後は、品質保持の点からなるべく早くご使用下さい。

速治膏についてのお問い合わせは、下記当社までお願いします。

通話料無料

ヨシダのコーヤク

製造 発売元  (合資会社) 吉田整骨院製薬所

0120-44-5089

〒865-0041 熊本県玉名市伊倉北方310-4
TEL.0968(73)2500 FAX.(74)2500