

切り取り線



第2類医薬品

日本薬局方 フェルビナクパップ

コラントデスFBパップ


【鎮痛消炎水性パップ剤】

セルフメディケーション
税控除対象

有効成分
フェルビナク配合
冷感タイプ

サイズ:10cm×14cm

切り取り線



ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品 日本薬局方 フェルビナクパップ

コランデス FB パップ

(1枚 10cm×14cm)

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

- (1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。 (3) 妊婦または妊娠していると思われる人。 (4) 15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。 (2) 湿疹、かぶれ、傷口。 (3) みずむしたむし等または化膿している患部。

3. 連続して2週間以上使用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

腰痛、関節痛、筋肉痛、打撲、捻挫、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、肩こりに伴う肩の痛み

【用法・用量】

表面のライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

15歳未満の小児は使用しないでください。

<用法・用量に関する注意>

(1) 定められた用法・用量を守ってください。(2) 本剤は痛みやはれ等の原因となっている病気を治療するのではなく、痛みやはれなどの症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。(3) 汗をかいた後や皮ふがぬれている場合は、良く拭き取ってから貼付してください。

【成分・分量】

本品1000cm²(膏体100g中)

有効成分 フェルビナク……0.5g

添加物として、プロピレンジコール、エタノール、ジイソプロパノールアミン、ポリソルベート80、l-メントール、エドト酸Na、パラベン、香料、その他10成分を含む

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しいところに保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。)

(4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、きちんとチャックを閉めて保管してください。(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

(6) 開封後はなるべく早く使用してください。

製造販売元 ダイヤ製薬株式会社

〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515

副作用救済制度

TEL:0120-149-931

お客様相談室TEL:0744-21-5588

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)