



\* 1 5 0 6 A 0 1 \*

ご使用前に、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

2015年6月初版

**第3類医薬品**

**鎮痒消炎薬**

湿疹、皮膚炎、かぶれに（非ステロイド製剤）

# タナールAZ軟膏

## 特長

- ・タナールAZ軟膏には消炎作用があり、皮膚炎、かぶれ、しっしん等の炎症を抑えます。
- ・基剤の保護作用により、からだ自身が治ろうとするはたらきを手助けし、すこやかな皮膚を取り戻します。
- ・顔などのデリケートな部分や、小さなお子様にもご使用いただける製剤です。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (3) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、ただちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

**【成分・分量】**(100g中)

アラントイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・1.0g

グリチルリチン酸二カリウム・・・・・・・・・・1.0g

ジメチルイソプロピルアズレン・・・・・・・・0.05g

※添加物として白色ワセリンを含有する。

**【効能・効果】**

湿疹、じんましん、皮膚炎、かぶれ、かゆみ、ただれ

**【用法・用量】**

1日2～3回皮膚に適量を塗布又は塗擦する。

**<用法・用量に関連する注意>**

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。

**【保管及び取り扱い上の注意】**

- (1) 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。)

**【お問い合わせ先】**

本製品について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

発売元 **日邦薬品工業株式会社**  
東京都渋谷区代々木3-46-16  
<http://www.nippo-yakuhin.jp/>

製造販売元 **ダイヤ製薬株式会社**  
奈良県橿原市上品寺町515

お客様相談室 TEL:0744-21-5588  
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)