

第2類
医薬品

販売名
ラフェルサ。FBローション a 外用消炎鎮痛剤

ご使用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに適切に保管してください。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

- (1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状(発赤・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (4) 15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
- (3) みずみずしたむし等または化膿している患部。

3. 長期運用しないでください

⚖ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位 症状

皮膚	発赤・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ
----	------------------------

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、喉のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦し、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

第2類医薬品

消炎鎮痛ローション

ラフェルサ。FBローション a

鎮痛成分
フェルピナク
3.0%
配合

清涼成分
ℓ-メントール
3.0%
配合

100mL

ラフェルサ。

第2類医薬品

大容量
100mL

肩の痛み、腰痛、
筋肉痛、関節痛

鎮痛成分
フェルピナク
3.0%
配合

清涼成分
ℓ-メントール
3.0%
配合

特長

- 消炎鎮痛成分フェルピナクが皮膚から浸透して炎症を起こした筋肉や関節に直接働きます。
- 精製ジプロパノールにより胃中や喉などの手の届きにくいところにも塗りやすい形状です。

機能・効果

腰痛、関節痛、筋肉痛、打球、捻挫、腱鞘炎(手・手指)、定音の痛みと腫れ、肘の痛み(テニス肘など)、肩こりに伴う肩の痛み

用法・用量

1日2～4回適量を患部に塗布してください。

(用法・用量に関する注意)

- (1) 15歳未満の小児に使用させないでください。
- (2) 定められた用法・用量を守ってください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診察を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 薬剤塗布後の患部をラップフィルム等の透気性の悪いもので覆わないでください。

成分・分量

本品100mL中
フェルピナク……3.0g
ℓ-メントール……3.0g
添加物としてインパノール、エタノール、プロレチリコール、グリセリン、ヒドロキシプロピルセルロース、トリエタノールアミン、香料を含有する。

消炎鎮痛ローション

ラフェルサ。
FBローション a

セルフメディケーション

税 控除 対象

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わる場合があります。)
- (4) 火気に入れないでください。
- (5) 火の中に入れないでください。
- (6) 使用済みの容器は火中に投げないでください。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、一度開封した後は使用期限内であっても品質保持の点からなるべくすみやかに使用してください。
- (8) 使用後はキャップをしっかりと締めてください。

副作用で救急診療制度

☎0120-149-931

本製品は、内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお問い合せ下さい。

発売元 白金製薬株式会社

〒634-0803

奈良県橿原市上品寺町515

お客様相談室

TEL.0744-21-5588

受付時間

9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

取扱販売 ダイワ製薬株式会社

〒634-0803

奈良県橿原市上品寺町515

エタノール 火気厳禁

第二石油類 水溶性 危険等級Ⅱ

MADE IN JAPAN

4 935583 204506

8 210840 2

2021年09月 第3版

製造番号
使用期限

8 210840 2

2021年09月 第3版