

第2類医薬品

ロキソプロフェンNa配合

コランデス LXローション

開封年月日
年 月 日

肩・腰・関節のつらい痛みに直接浸透

第2類医薬品

ロキソプロフェンNa配合

コランデス LXローション

肩・腰・関節の
つらい痛みに
直接浸透



25g
セルフレブ薬用ローション
税 控 除 対 症

ご使用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

△ 使用上の注意

× [してはいけないこと]
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 次の人は使用しないでください(本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人)。(1) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用してぜんそくを起したことがある人。(2) 15歳未満の小児。(2) 次の部位には使用しないでください(1) 目の周囲、粘膜炎。(2) 皮膚の弱い部位(頬、わきの下等)。(3) 湿疹、かぶれ、傷口。(4) ぬすむし、たむし等又は化膿している患部。3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないでください(4) 連続して2週間以上使用しないでください(本剤は痛みを一時的におさえるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診察を受けてください。)

★ [相対すること]

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3) 妊娠又は妊娠していると思われる人。(4) 高齢者。(5) 次の診断を受けた人、気管支ぜんそく(2) 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱、色素沈着
消化器	胃部不快感、みぞおちの痛み
その他	むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

第2類医薬品

販売名:コランデスLXローション
外用消炎鎮痛剤

3. 使用後、次の症状があらわれやすくなる場合がありますので、このような症状の持続又は増強があらわれた場合には、使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。なお、下部・軟便4.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【保存及び取り扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密閉して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(4) 服用の薬品になつたり品質が変わる場合があります。(5) 火気に近づけないでください。(5) 本剤は化学繊維、プラスチック類、紙製等を溶かしやすくなりますので、床、家具、メガネ等につかないようにしてください。(6) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封した後は、なるべく早く使用してください。

【用法・用量】

1日3～4回、適量を患部に塗布してください。
＜用法・用量に關する注意＞(1) 用法・用量を厳守してください。(2) 15歳未満の小児は使用しないでください。(3) 使用部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。(4) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状があらわれた場合だけ使用してください。(5) 1回あたり約2g(塗布面積の目安:約20cm×10cm)、1週間あたり50gを超えて使用しないでください。(6) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けてください。(7) 外用のみ使用してください。

【成分・分量】(本品100g中)

ロキソプロフェンナトリウム水和物……1.13g
(無水物として1g) 添加物:エタノール、L-メントール、ゼラチン、クエン酸水和物、香料

【効能・効果】

関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫、腱鞘炎(手・手指の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)

MADE IN JAPAN

火気厳禁
(第二石油類 危険等級III水溶性 エタノール含有)

製造販売元
ダイヤ製薬株式会社
〒634-0803 奈良県橿原市上島寺町515

お客様相談室

TEL:0744-21-5588 受付時間9:00～17:00
(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



製造
番号
使用
期限

紙箱

2206A01