

使用に際して、必ずこの添付文書をお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

皮膚疾患薬

しっしん・かぶれ・かゆみ止め フジアロ[®]-H軟膏 10g

◆ **フジアロ[®]-H軟膏**は、炎症を緩和し、痛み・かゆみ等の症状を鎮める効果があります。
また、皮ふ患部を保護し、化膿を防いで治癒を促します。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の部位には使用しないでください。
水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください。
3. 長期連用しないでください。

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (3) 薬や化粧品等によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 患部が広範囲の人
 - (5) 湿潤やただれのひどい人
 - (6) 深い傷やひどいやけどの人
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮ふ(患部)	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、 化膿症状、持続的な刺激感

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

裏面もお読みください。

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)外用のみに使用してください。

成分・分量

本品100g中

成分	含量	はたらき
コルチゾン酢酸エステル	300mg	即効性の副腎皮質ホルモンで湿疹、皮膚炎、かゆみ、虫さされによる炎症をしずめます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	300mg	かゆみや炎症を抑えます。
グリチルレチン酸	500mg	患部の炎症をしずめます。
ジブカイン塩酸塩	200mg	局所麻酔作用により患部の痛み、かゆみをしずめます。
イソプロピルメチルフェノール	100mg	殺菌・抗菌作用により、化膿を防ぎます。
トコフェロール酢酸エステル (ビタミンE)	500mg	皮ふの血行を促進し、患部の治りをはやめます。
アラントイン	200mg	化膿を防ぎ、肉芽形成作用により患部の治りを促進します。

添加剤：流動パラフィン、セタノール、グリセリン脂肪酸エステル、自己乳化型ステアリン酸グリセリン、ステアリン酸マクロゴール、ポリソルベート80、メチルポリシロキサン、プロピレングリコール、D-ソルビトール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、パラベン、乳酸、エデト酸Na水和物 含有

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)外箱に表示の配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先 株式会社 富士薬品 (学術室)
電話 (048)648-1118 9:00~17:30 (土、日、祝日を除く)

製造販売元 **株式会社 富士薬品**
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地