

使用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

鎮痛消炎塗布剤

肩こり・筋肉疲労 フジタッチ[®]

◆**フジタッチ**は、*l*-メントール、サリチル酸メチル、および*dl*-カンフルを主剤とした清涼感のある外用液剤です。

患部に塗るだけで、有効成分が皮膚より浸透し、肩こりや筋肉痛などに速やかな効果を発揮します。



使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の部位には使用しないでください。

- (1)目の周囲、粘膜等
- (2)湿疹、かぶれ、傷口

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効 能 ・ 効 果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

用 法 ・ 用 量

適量を1日数回、皮膚に塗布してください。

○塗布部をお肌当てて軽く押すと薬液が出ます。充分塗布部に薬液をしみ込ませてから、患部に軽く塗ってください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法をお守りください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)外用にのみ使用してください。



肩こり



腰 痛



打撲・捻挫

裏面もお読みください。

成分・分量

100mL中

成分	含量	はたらき
l-メントール	6,000mg	清涼感を与え、痛みをやわらげます。
dl-カンフル	2,000mg	血行を改善し、痛みをやわらげます。
サリチル酸メチル	7,500mg	炎症や痛みを抑えます。
グリチルレチン酸	200mg	炎症を抑え、肩こりや筋肉痛をやわらげます。
ノニル酸ワニリルアミド	10mg	患部を温め、血行を改善します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	100mg	かゆみや炎症を抑えます。
ハッカ油	1,000mg	肩こりや筋肉痛による痛みをやわらげます。

添加剤:マクロゴール、プロピレングリコール、クエン酸水和物、ハアセチルしょ糖、エタノール 含有

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5)火気に近づけないでください。

お問い合わせ先 株式会社 富士薬品(学術室)
電話(048)648-1118 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **株式会社 富士薬品**
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地