


肩こり

腰痛

関節痛

インドメタシン配合



8枚入

微香性

のびるんです
伸縮性

チャック

開封後はチャックをしめて保管して下さい。

切り取り線

肌にフィット

イスターパップ® ID

第2類医薬品

製造販売元



株式会社 富士薬品

セルフメディケーション
税 控除 対象

配置用

ご使用に際して、この説明文を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

インドメタシン製剤
鎮痛消炎薬 **イスターパップ® ID**

- 医療用にも使われている成分のインドメタシンが、痛みのもととなる物質の生成を抑え、腰痛、関節痛に優れた効果を発揮します。
- 伸縮性のよい基布で関節にもピッタリフィットします。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 次の人は使用しないで下さい。
(1) 次の人又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(2) ぜんそくを起こしたことがある人 (3) 11歳未満の小児
 2. 次の部位には使用しないで下さい。
(1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口
(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部
 3. 長期連用しないで下さい。

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果 肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、打撲、捻挫、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)

用法・用量 表面のプラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付して下さい。

(用法・用量に関連する注意) (1)定められた用法・用量を守って下さい。(2)11歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとで使用して下さい。(3)11歳未満の小児には使用させないで下さい。(4)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用して下さい。(5)連続して2週間以上使用しないで下さい。(6)患部が汗等で濡れている時は、よく拭いて下さい。

成分・分量 (膏体100g中：1000cm²)

成 分	含 量	はたらき
インドメタシン	375mg	炎症を鎮め、痛みをやわらげます

添加物：セラチン、エデト酸ナトリウム水和物、マクロゴール、ポリソルベート80、*l*-メントール、カオリン、酸化チタン、濃グリセリン、D-ソルビトール、ヒマシ油、ポリアクリル酸部分中和物、カルメロースナトリウム、pH調節剤、その他2成分含有

保管及び取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)(4)未使用分はもとの袋に入れ、チャックをきちんと閉めて下さい。配置期限内であっても開封後はなるべく早く使用して下さい。(5)配置期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

8枚入 [12cm×8.5cm]

配置期限

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

製造番号

お客様ご相談窓口
(株)富士薬品(学術室)
☎(048)648-1118
受付 9:00～17:30
(土・日・祝日を除く)



(01)14987524903617(93)2004

製造販売元



株式会社 富士薬品

埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地

