

使用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

使用上の注意

☒ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 次の部位には使用しないこと
 - (1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部
 - (2) 創傷面、目の周囲、粘膜等
 2. 顔面には、広範囲に使用しないこと
 3. 長期連用しないこと

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 患部が広範囲の人
 - (5) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

火気厳禁
第二石油類 危険等級Ⅲ 水溶性
エタノール含有物 30mL

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して立てて保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがある)
- (4) 火気に近づけないこと
- (5) 次の物には付着させないこと(変質する場合があります)
床や家具などの塗装面、メガネ、時計、アクセサリー類、プラスチック類、繊維製品、皮革製品等
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
また、開封後は使用期限内であってもなるべく早く使用すること
- (7) 染めた髪につくと色落ちすることがある

副作用被害救済制度
電話：0120-149-931

製造販売元
株式会社 富士薬品
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地

塗りやすい
ピンポイント容器



頭皮のかゆみ 湿疹に

9つの有効成分が
すばやく効く

アンデラッグステロイド剤 PVA配合

30mL

フジアD-HD液

第②類医薬品


効能・効果

かゆみ、湿疹、皮膚炎、かぶれ、あせも、じんましん、虫さされ

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈液容器の使用〉



- 使用前に、容器の先端を上に向けて、手の指で押して中の空気を抜いてください。
(暑い時期には内圧が高まり、薬液が多くでることがありますので、これを防ぐためです)
- 患部に使用する時は容器を下向き又は斜めにして、患部に先端を軽く押しあてて塗布してください。
(先端を患部からはなすと、薬液がでなくなります)

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守ること
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- (3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- (4) 外用にのみ使用すること

成分・分量 100mL中

プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル(PVA) 0.15g、グリチルレチン酸 0.2g、リドコイン 2.0g、ジフェニド ラミン塩酸塩 2.0g、クロタミトン 5.0g、サリチル酸グリコール 1.0g、イソプロピルメチルフェノール 0.5g、アラントイン 0.2g、l-メントール 3.5g

添加剤：プロピレングリコール、ラウロマクロゴール、乳酸、乳酸Na、ジブチルヒドロキシトルエン、ヒプロメロース、エタノール 含有

第②類医薬品

販売名：
フジアローHD液
鎮痒消炎薬
内容量 30mL

お問い合わせ先
株式会社 富士薬品
(学術室)
電話 (048) 648-1118
9:00~17:30
(土、日、祝日を除く)

セルフメディケーション
税 控除 対象

