

ご使用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品

鎮痒消炎薬

## 虫さされ・かゆみに フジアロ-EX10ゲル

- ◆**フジアロ-EX10ゲル**は、アンテドラッグステロイド剤である「プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル(PVA)」を含む10種類の有効成分を配合した塗り広げやすいゲルタイプのお薬です。アンテドラッグは、患部で優れた効果を発揮したのち、体内に吸収されると低活性物質に変化します。PVAは湿疹や皮膚炎等の炎症をしずめます。
- ◆ジフェンヒドラミン塩酸塩、クロタミトン、リドカインが虫さされや湿疹等のかゆみを抑えます。
- ◆サリチル酸グリコールとグリチルレチン酸が湿疹等の炎症をしずめます。
- ◆イソプロピルメチルフェノールが患部を殺菌します。
- ◆アラントインが傷の治りを助け、組織を修復します。
- ◆*l*-メントールと*dl*-カンフルの清涼感によりかゆみをしずめます。



### 使用上の注意

#### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の部位には使用しないでください。
  - (1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部
  - (2)創傷面、目の周囲、粘膜等
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください。
3. 長期連用しないでください。



#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1)医師の治療を受けている人
  - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (4)患部が広範囲の人
  - (5)湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮 膚 (患 部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 効 能 ・ 効 果

虫さされ、かゆみ、湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、じんましん  
裏面もお読みください。

## 用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量をお守りください。
  - (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
  - (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
  - (4)本剤にはアルコールが含有されているため、塗布した時にしみることがあります。
  - (5)本剤のついた手で、目など粘膜にふれないでください。
  - (6)外用にのみ使用してください。
- ※擦り込むように塗ると、ゲルが固まり肌から剥がれることがありますので、薄くのばし肌にのせるように塗布してください。

## 成分・分量

100g中

成分	分量	はたらき
プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル(PVA)	0.15 g	抗炎症作用により、はれ、赤みを抑えます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.0 g	抗ヒスタミン作用により、かゆみを抑えます。
リドカイン	2.0 g	局所麻酔作用により痛み、かゆみを抑えます。
グリチルレチン酸	0.2 g	炎症をしずめます。
クロタミトン	5.0 g	湿疹・かぶれ等に伴うかゆみを抑えます。
サリチル酸グリコール	1.0 g	炎症をしずめます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1 g	殺菌作用があります。
アラントイン	0.2 g	傷の治りを助け、組織を修復します。
l-メントール	3.5 g	清涼感を与え、かゆみをしずめます。
dl-カンフル	1.0 g	清涼感を与え、かゆみをしずめます。

添加剤：アジピン酸ジイソプロピル、乳酸、乳酸ナトリウム液、ヒドロキシプロピルセルロース、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、プロピレングリコール、ベンジルアルコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エタノール 含有

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)火気に近づけないでください。また、使用後は火中に投じないでください。
- (5)次の物には付着させないでください。(変質又は変色する場合があります。)  
床や家具等の塗装面、メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、プラスチック類、化繊製品、皮革製品等。
- (6)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。
- (7)揮発性がありますので、使用後はキャップをしっかりと締めてください。

お問い合わせ先 株式会社 富士薬品 (学術室)  
電話 (048)648-1118 9:00~17:30 (土、日、祝日を除く)

製造販売元 **株式会社 富士薬品**

埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地

01FK00