

ご使用に際して、この台紙の説明書をよくお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

湿疹・皮膚炎治療薬

第2類医薬品

# ピュアクイックS軟膏

## ■特徴

高い消炎効果のプレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステルを配合したアンテドラッグステロイド外用剤。アンテドラッグとは、塗布した患部で効き目を発揮し、体内で低活性物質に変わる薬剤です。

## ⚠️ 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の部位には使用しないでください。  
水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください。
3. 長期連用しないでください。



## ■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(4) 患部が広範囲の人。  
(5) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
皮膚（患部）	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 効能・効果

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん

## 用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

## 成分・分量

成分	分量（1 g 中）
プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	1.5mg

[添加物] 白色ワセリン、軽質流動パラフィン、パラフィン

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 高温をさげ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 使用期限（台紙及びチューブに記載）を過ぎた製品は使用しないでください。

**包 装**

1箱(2g x 1本)入り

**お問い合わせ先**

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

連絡先 大鵬薬品工業株式会社 お客様相談室

〒101-8444 東京都千代田区神田錦町1-27

電話番号 0120-4527-66

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度の問い合わせ先

**(独) 医薬品医療機器総合機構**

[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

0120-149-931（フリーダイヤル）

販売元

大鵬薬品工業株式会社

東京都千代田区神田錦町1-27

<https://www.taiho.co.jp/>

製造販売元

岡山大鵬薬品株式会社

岡山県備前市久々井字沖1775-1