

この説明書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

がまんできないかゆみに [外用副腎皮質ホルモン剤]

鎮痒消炎薬

ギルメサゾン[®]α

第②類医薬品

湿疹や皮膚炎は、皮膚病のなかで最も一般的にみられるもので、体質的な原因によって起こるアトピー性皮膚炎、刺激性の物質に触れた時に起こる接触性皮膚炎、じんましんなどが代表的なものです。これらはいずれも痒みを伴い、掻きこわしを起こしやすいので、炎症の抑制と共に痒みを止める事が大切です。ギルメサゾンαは、患部の炎症、はれ、かゆみなどの症状に優れた効果を発揮し、その後体内に吸収されると分解され低活性の物質に変化するアンテドラッグタイプのステロイド（PVA:プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル）に、痒みを抑えるクロタミトン、掻き壊しによる二次感染を防ぐ殺菌成分のイソプロピルメチルフェノール、血行を促進し症状の回復を助けるトコフェロール酢酸エステルを配合した皮膚に塗布しやすい軟膏で、湿疹やかぶれ、皮膚炎などを改善し、痒みを鎮めます。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください

水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。

2. 顔面には、広範囲に使用しないでください

3. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 患部が広範囲の人。
- (5) 湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮 膚 (患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん

(裏面ににつづく)

用法・用量

1日数回適量を患部に塗擦してください。

【用法・用量に関連する注意】

- (1)用法・用量を守ってください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)本剤は外用にのみ使用してください。
- (5)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (6)本剤を塗布後、使用部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。

【使用時のアドバイス】

- 軟膏は厚く塗る必要はありません。薄く患部に塗るだけで十分な効果を示します。
- 軟膏を塗りかえる時は、前日に塗った所の軟膏や汚れを、強くこすらないように、ガーゼや脱脂綿で、できるだけ落としてから、新たに軟膏を塗布してください。

成分と働き


100g中に次の成分を含んでいます。

成分	含量	働き
プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	0.15g	アンテドラッグステロイド成分で、湿疹・皮膚炎などの炎症を鎮めます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌作用により、患部の二次感染による悪化を防ぎます。
クロタミトン	5.0g	湿疹かぶれ等に伴うかゆみを鎮めます。
トコフェロール酢酸エステル	0.5g	血行を促進し、患部の回復を早めます。

添加物として、ゲル化炭化水素を含んでいます。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。



副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

お問い合わせ先

本剤のご使用により、何か変わった症状があらわれるなど、お気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

三宝製薬株式会社 お客様相談室 電話03-3952-0100
月～金曜日 9:00～17:00 (祝日を除く)



発売元
三宝製薬株式会社
東京都新宿区下落合2-3-18

製造販売元
日本ゼトック株式会社
東京都新宿区西新宿1-26-2