

2018年7月

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

鎮痒消炎薬

中京サロカインジェル

(販売名：ミナゼリー)

中京サロカインジェルは、しっしん・かゆみ・虫さされなどに効く、速乾ジェルタイプの塗り薬です。リドカイン（局所麻酔剤）、ジフェンヒドラミン（抗ヒスタミン剤）などが配合され、かゆみを素早くしずめます。また、炎症を抑える作用もあわせ持っていますので、しっしんなどにも確かな効果を発揮します。

⚠ 使用上の注意

相談すること



- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
 - 医師の治療を受けている人。
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 湿潤やただれのひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

効能・効果

かぶれ、湿しん、じんましん、皮膚炎、あせも、しもやけ、虫さされ、かゆみ、ただれ

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布して下さい。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守して下さい。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3)目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- (4)本剤は外用にのみ使用し、内服しないで下さい。
- (5)患部やその周囲が汚れたまま使用しないで下さい。

成分・分量

100g中

成分	分量
l-メントール	4.00g
dl-カンフル	3.00g
リドカイン	2.00g
ジフェンヒドラミン	1.00g

添加物としてトリイソプロパノールアミン、プロピレングリコール、エタノール、その他3成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)配置期限(ケースに記載)を過ぎた製品は使用しないで下さい。なお、配置期限内であっても、開封後はなるべく早く使用して下さい。
- (5)本剤は揮発性ですので、キャップをあけて放置するとチューブの口の部分が白くなることがあります。白くなくても効果に変わりはありませんが、使用後は密栓して下さい。
- (6)火気に近づけないで下さい。
- (7)アルコールなどにとけるおそれのあるもの(めがねのわく、塗装家具など)にはつかないようにして下さい。

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、販売業者又は下記までご連絡下さい。

日本ゼトック株式会社

電話 0120-886-440

受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00(土、日、祝日を除く)



世界の子供たちに健康と教育を
国際貢献活動を支援します

この商品の売り上げの一部は「きずなASSIST基金」に寄付されます。



〈発売元〉
株式会社 中京医薬品

愛知県半田市亀崎北浦町2-15-1

〈製造販売元〉

日本ゼトック株式会社

東京都新宿区西新宿1-26-2