

第②類医薬品

新グリコーチノン50

湿疹・かぶれ・かゆみ・じんましんに

皮膚病薬

注意

1. 次の部位には使用しないで下さい。
水痘(水ぼうそう)、みずむしたむし等又は化膿している患部。
2. 顔面には広範囲に使用しないで下さい。
3. 使用が適さない場合があるので、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
4. 使用に際しては、説明文書をよく読んで下さい。
5. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
6. 小児の手の届かない所に保管して下さい。

10g



製造販売元 日本ゼトック株式会社
東京都新宿区西新宿1-26-2

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

鎮痒消炎薬 新グリコチノン50

第②類医薬品



使用上の注意

⊗してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと。
水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
2. 顔面には広範囲に使用しないこと。
3. 長期連用しないこと。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) 患部が広範囲の人。(5) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

用法・用量

1日数回適量を患部に塗擦する。

(用法・用量に関連する注意)

(1) 用法・用量を厳守して下さい。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。(3) 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗い流して下さい。なお症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。(4) 本剤は外用にのみ使用して下さい。(5) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないで下さい。

効能・効果

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

成分・分量 100g中

成分	分量	成分	分量	成分	分量
ヒドロコチノン酢酸エステル	0.5g	グリチルレチン酸	0.5g	イソプロピルメチルフェニール	0.1g

添加物としてソルビタン脂肪酸エステル、セタノール、流動パラフィン、プロピレングリコール、ラウリル硫酸Na、リン酸二水素Na、その他2成分を含有します。

保管及び 取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

01



4 989183 220022

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡下さい。

日本ゼットック株式会社

☎ 0120-886-440

(受付時間:9:00～12:00、13:00～17:00(ただし土、日、祝日を除きます))