

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

炎症・かゆみ止めの応急手当てに

第②類医薬品

ダイヤモンド軟膏

鎮痒消炎薬

製品の特徴

ダイヤモンド軟膏には、コルチゾン酢酸エステル（副腎皮質ホルモン）をはじめ4つの有効成分が配合されており、皮膚の炎症やかゆみに効果を発揮します。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと ❌

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）

1. 次の部位には使用しないでください。
 - (1)水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部
 - (2)目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください。
3. 長期連用しないでください。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4)患部が広範囲の人
 - (5)湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】

かゆみ、かぶれ、しっしん、虫さされ、じんましん、しもやけ、皮膚炎、あせも、ただれ

【用法・用量】

1日1～3回、適量を患部に塗布してください。

【用法・用量に関連する注意】

- (1)使用量は必要最小限にとどめてください。
- (2)定められた用法、用量を守ってください。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (5)外用にのみ使用してください。
- (6)本剤を塗布後、その部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。

【成分・分量】

1 g 中 コルチゾン酢酸エステル … 5 mg クロタミトン …………… 50 mg
 グリチルレチン酸 …………… 3 mg トコフェロール酢酸エステル … 5 mg
添加物：ステアリルアルコール、プロピレングリコール、アジピン酸ジイソブ
ロピル、メチルポリシロキサン、カルボキシビニルポリマー、自己乳化型ステア
リン酸グリセリン、ポリオキシエチレンセチルエーテル、トリエタノールアミ
ン、パラベン、香料

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）
- (4)配置期限（外箱記載）を過ぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡ください。
新生薬品株式会社 消費者相談窓口
〒930-0364 富山県中新川郡上市町横越16番1
電話番号 (076)-472-0361 受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **新生薬品株式会社**

富山県中新川郡上市町横越16番1

SN0