

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要ときに読めるよう大切に保管してください。

鎮痒消炎薬

虫さされ・かゆみ・かぶれ

ピカ^{イチ}ゲル

第3類医薬品

製品の特長

本剤は、透明なゼリー状のアルコール性基剤に有効成分を完全に溶解させており、虫さされ、かぶれなどのたまらないかゆみを、冷却感と共に、速やかに取り除きます。本剤にはステロイドを配合していません。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3)湿潤やただれのひどい人。
 - 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
- | 関係部位 | 症 状 |
|------|--------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |
- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

【効能・効果】

かぶれ、かゆみ、しもやけ、あせも、じんましん、湿疹、虫さされ、皮膚炎

【用法・用量】

1日数回、患部に塗布してください。

【用法・用量に関連する注意】

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。

（裏面も必ずお読みください）

[成分・分量]

成分名	分量 (1g中)	作用等
ジフェンヒドラミン	10mg	抗ヒスタミン作用により、発赤、かゆみなどの炎症症状を取り除きます。
アミノ安息香酸エチル	8mg	局所麻酔作用により、かゆみ、痛みを抑えます。
l-メントール	30mg	局所の知覚を鈍麻し、痛み、かゆみを抑えます。
d-カンフル	15mg	局所を刺激して血行を改善し、痛み、かゆみを取り除きます。

添加物：ラウロマクロゴール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エタノール、1,3-ブチレングリコール、カルボキシビニルポリマー、トリエタノールアミン

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に、密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
- (4)配置期限（外箱記載）を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5)本剤の性質上、塗布時に皮膜が剥がれ、ざらつきを感じることはありません。
- (6)一部のプラスチック製品、塗料、皮革等に付くと損耗或いはシミの原因になることがありますから付かないようにしてください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡ください。
新生薬品株式会社 消費者相談窓口 [9:00~17:00 (土、日及び祝日を除く。)]
〒930-0364 富山県中新川郡上市町横越16番1
電話番号 (076) 472-0361

発売元 **第一薬品工業株式会社**
富山県富山市草島15-1

製造販売元 **新生薬品株式会社**
富山県中新川郡上市町横越16番1