

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

鎮痒消炎薬

かゆみ・炎症に

ピカ1S
非ステロイド剤

第3類医薬品

製品の特長

本剤は、抗ヒスタミン剤ジフェンヒドラミン塩酸塩を2%配合し、d-カンフル、l-メントール、サリチル酸メチルの爽快な刺激感と共に、かゆみ、湿疹などの炎症症状を軽減いたします。副作用の気になるステロイド剤は配合しておりません。

△ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

[効能・効果]

かゆみ止め、かぶれ、しもやけ、あせも、湿疹、皮膚炎、じんましん

[用法・用量]

用にのぞみ、1日数回患部に塗布又はすりこんでください。

[用法・用量に関する注意]

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。

[成分・分量] 1g 中

成 分 名	分 量	作 用 等
ジフェンヒドラミン塩酸塩	20mg	抗ヒスタミン作用により、発赤、かゆみなどの炎症症状を取り除きます。
トコフェロール酢酸エステル	5mg	末梢の血流を改善し、患部の修復を早めます。
グリチルレチン酸	1mg	非ステロイド性の抗炎症作用により、炎症症状を軽減します。
サリチル酸メチル	20mg	局所深部を刺激して血流を改善し、炎症に伴う痛みを軽減します。
l-メントール	50mg	局所の知覚を鈍麻し、痛み、かゆみを抑えます。
d-カンフル	20mg	局所を刺激して血行を改善し、痛み、かゆみを取り除きます。

添加物：ステアリン酸、セタノール、流動パラフィン、プロピレングリコール、自己乳化型ステアリン酸グリセリン、スクワラン、ポリソルベート80、ラウリル硫酸Na、水酸化K

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に、密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください (誤用の原因になったり品質が変わります。)。
- (4) 配置期限(外箱記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡ください。

新生薬品株式会社 消費者相談窓口 [9:00~17:00(土、日及び祝日を除く。)]

〒930-0364 富山県中新川郡上市町横越16番1 電話番号(076)472-0361

発 売 元 第一薬品工業株式会社

富山県富山市草島15-1

製造販売元 新生薬品株式会社

富山県中新川郡上市町横越16番1

SN0