

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

## 第3類医薬品

デリケートポイントのかゆみに

## ホームベビー軟膏

## 製品の特徴

かゆみを抑える成分（ジフェンヒドラミン、グリチルレチン酸）、雑菌の繁殖を防止する成分（イソプロピルメチルフェノール）、傷んだ肌を修復する成分（アラントイン、トコフェロール酢酸エステル）、これらの成分を、ベタつかず、マイルドな使用感の親水性クリームに配合しました。副作用の気になるステロイドは配合しておりません。



## 使用上の注意



## してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

次の部位には使用しないでください。

目の周囲、粘膜等



## 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 湿潤やただれのひどい人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 【効能・効果】

かゆみ、かぶれ、ただれ、湿疹、皮膚炎、じんましん、あせも、虫さされ、しもやけ

## 【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布又はすりこんでください。

## 【用法・用量に関する注意】

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。

（必ず裏面もお読みください）

**[成分・分量] 1g 中**

成 分 名	分量	作 用 等
ジフェンヒドラミン	10mg	抗ヒスタミン作用でかゆみを抑えます。
イソプロピルメチルフェノール	30mg	悪化を引き起こす雑菌の増殖を防止します。
アラントイン	5mg	荒れた肌を修復します。
グリチルレチン酸	10mg	かゆみ等の炎症を抑えます。
トコフェロール酢酸エステル	5mg	血流を改善し組織の修復を助けます。

添加物：ラウロマクロゴール、マクロゴール、ワセリン、セタノール、ステアリルアルコール、ステアリン酸、プロピレンジリコール、ミリスチン酸イソプロピル、スクワラン、自己乳化型ステアリン酸グリセリン、フィットステロール、ラウリル硫酸Na、ボリオキシエチレンセチルエーテル

**【保管及び取扱い上の注意】**

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に、密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限(外箱記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

**こんなかゆみ等の症状にもホームベビー軟膏をお使いください。**

- 生理時のかゆみ：生理時は肌が敏感。生理用品や経血によるちょっとした刺激がかゆみとなってあらわれます。そんな時のかゆみにも。
- おりものや汗によるかゆみ：おりものや汗による刺激もかゆみとなります。さらに雑菌が繁殖して不快な症状を増大させます。そうなる前に。
- 下着・ストッキングによるかゆみ：下着やストッキングの素材による刺激や締め付けによる刺激、ムレによってもかゆみが引き起こされます。そんな時にも。
- その他のかゆみ：陰部周辺のかゆみ、肌の乾燥によるかゆみ。かゆみは、かぶれや皮膚炎の初期症状です。搔くことによって症状が悪化します。かゆみの原因となっている刺激物を除去することが大事ですが、搔く前に、ホームベビー軟膏をお使いください。

**注意**

本剤で、カンジダ症やトリコモナス症によるかゆみを治療することはできません。それらが疑われる場合には、専門医の診療を受けてください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡ください。[受付時間 9:00~17:00(土、日及び祝日を除く)]

新生薬品株式会社 消費者相談窓口 電話番号(076)472-0361  
〒930-0364 富山県中新川郡上市町横越16番1