

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要ときに読めるよう大切に保管してください。

オールシーズン、「かゆみ」をブロック！

第2類医薬品

# エマテクトール

鎮痒消炎薬

- エマテクトールは基剤成分として、保湿作用のある濃グリセリンと水溶性高分子を配合し、「かゆみ」を増強させる肌の乾燥を防ぎます。  
従って、春～秋にかけて多い、虫さされ、湿疹、あせも等に伴う「かゆみ」だけでなく、秋～春に多い、肌の乾燥に伴う「かゆみ」にも効果をあらわします。
- エマテクトールは、副腎皮質ホルモン剤（コルチコステロイド剤）を配合しておりません。
- エマテクトールはスポンジ塗布型の容器を採用していますから、手指を汚さずに広範囲に塗布し易く、しかも粘稠液剤ですから、液ダレが少なく、滑らかな使用感です。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
    - (1) 医師の治療を受けている人
    - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
    - (3) 湿潤やただれのひどい人
  2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
- | 関係部位 | 症 状                               |
|------|-----------------------------------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感 |
3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

## 《効能・効果》

かゆみ、湿疹、皮膚炎、かぶれ、虫さされ、じんましん、しもやけ、あせも、ただれ

## 《用法・用量》

1日数回、患部に塗布してください。

### 【用法・用量に関連する注意】

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)外用にのみ使用してください。

## 【使用方法】

キャップを外し、容器を逆さまにし、スポンジ中央部を押して、液がスポンジにしみてからご使用ください。

## 《成分・分量》 本品100g中

成分名	分量 (100g中)	作用等
ジフェンヒドラミン	1.0g	「かゆみ」のもと、ヒスタミンの作用を止める。
リドカイン	2.0g	局所麻酔作用により、素早く「かゆみ」を止める。
クロタミトン	5.0g	特異な鎮痒作用により「かゆみ」を止める。
l-メントール	1.0g	清涼感を与え「かゆみ」を軽減する。

添加物：ラウロマクロゴール、グリセリン、プロピレングリコール、ヒドロキシエチルセルロース、エタノール、香料

## 《保管及び取扱い上の注意》

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に、密栓して、立てて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)火気に近づけないでください。
- (5)配置期限(外箱記載)を過ぎたものは使用しないでください。
- (6)本剤はプラスチック類を軟化させたり、塗料を溶かしたりすることがあるので、付着しないようにしてください。

---

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡ください。[9:00~17:00(土、日及び祝日を除く)]

新生薬品株式会社 消費者相談窓口 電話番号076-472-0361  
〒930-0364 富山県中新川郡上市町横越16番1