

[日本薬局方 フェルピナクパップ]

シロパステルピナク

24枚入
(6枚×4袋)

第2類医薬品

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

【特長】

- 一枚あたりフェルピナクを70mg含有しています。
- 肩・腰・関節などの痛みにすぐれた効果を発揮する鎮痛・消炎シップ薬です。
- フェルピナクが患部に直接浸透し、痛みの原因プロスタグランジンの発生を抑えます。
- 伸縮性に富んだ不織布を使用しているため、フィット感にすぐれています。

⚠【使用上の注意】

してはいけないこと 【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります】

1. 次の人は使用しないで下さい
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。(2) ぜんそくを起こしたことがある人。(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(4) 15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないで下さい
(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。
(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。
3. 連続して2週間以上使用しないで下さい

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ等

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

【効能・効果】

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとほれ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

【用法・用量】

年齢	使用方法
15歳以上	表面のライナー(フィルム)をはがし、1日2回を限度として患部に貼付して下さい
15歳未満	使用しないで下さい

【用法・用量に関する注意】

1. 用法・用量を厳守して下さい
2. 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用して下さい
3. 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用して下さい
4. 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用して下さい

【成分・分量】 <膏体 100g中>

成分	含量	作用
フェルピナク	0.5g	炎症を抑え、痛みをやわらげます

添加物: ポリアクリル酸部分中和物、ポリアクリル酸Na、ポリビニルアルコール、CMC-Na、グリセリン、D-ソルビトール、カルボキシビニルポリマー、酒石酸、ヒマシ油、エト酸Na水和物、酸化チタン、ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート、ポリソルベート80、L-メントール、カオリン、香料
[1枚あたり(10cm×14cm)膏体量1.4g]

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい
3. 他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)
4. 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開封口のチャックをきちんと閉め外気にふれないようにして下さい
5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい

製造販売元

株式会社 **マイクロ薬品**

〒475-0828 愛知県半田市瑞穂町2の6の5



副作用被害救済制度の問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本剤についてのお問い合わせは、下記をお願いします。
株式会社 マイクロ薬品 TEL 0569-32-9450
受付時間 (9:00～12:00、13:00～17:00 土・日・祝日を除く)

セルフメディケーション

税 控除 対象



4 580250 550068

製造番号

使用期限

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

有効成分【フェルビナク】配合 鎮痛・消炎シップ薬

シンパスフェルビナク

24枚入

(6枚×4袋)

第2類医薬品

【特長】

- 1枚あたりフェルビナクを70mg含有しています。
- 肩・腰・関節などの痛みにすぐれた効果を発揮する鎮痛・消炎シップ薬です。
- フェルビナクが患部に直接浸透し、痛みの原因プロスタグランジンの発生を抑えます。
- 伸縮性に富んだ不織布を使用しているため、フィット感にすぐれています。

⚠【使用上の注意】

× してはいけないこと 【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります】

- 次の人は使用しないで下さい
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。(2) ぜんそくを起こしたことがある人。(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(4) 15歳未満の小児。
- 次の部位には使用しないで下さい
(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。
(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- 連続して2週間以上使用しないで下さい

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ等

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けて下さい。

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

- 3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

【効能・効果】

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

【用法・用量】

年齢	使用方法
15歳以上	表面のライナー(フィルム)をはがし、1日2回を限度として患部に貼付して下さい
15歳未満	使用しないで下さい

【用法・用量に関する注意】

- 用法・用量を厳守して下さい
- 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用して下さい
- 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用して下さい
- 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用して下さい

【成分・分量】 <膏体 100g中>

成分	含量	作用
フェルビナク	0.5g	炎症を抑え、痛みをやわらげます

添加物: ポリアクリル酸部分中和物、ポリアクリル酸Na、ポリビニルアルコール、CMC-Na、グリセリン、D-ソルビトール、カルボキシビニルポリマー、酒石酸、ヒマシ油、エデト酸Na水和物、酸化チタン、ジヒドロキシアリミニウムアミナセテート、ポリソルベート80、トメントール、カオリン、香料
【1枚あたり(10cm×14cm) 膏体量 14g】

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい
- 小児の手の届かない所に保管して下さい
- 他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)
- 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開封口のチャックをきちんと閉め外気にふれないようにして下さい
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい

製造販売元

株式会社 ミクロ薬品

〒475-0828 愛知県半田市瑞穂町2の6の5

副作用被害救済制度の問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本剤についてのお問い合わせは、下記にお願いします。
株式会社 ミクロ薬品 TEL 0569-32-9450
受付時間(9:00～12:00、13:00～17:00 土・日・祝日を除く)



4 580250 550211

製造番号

使用期限