

使用前にこの説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

鎮痛・消炎冷感パップ剤

クールクレストa

第3類医薬品

特長

- 粘着力が強く、皮ふにピッタリ良くつきます。
- 高含水率の基剤を使用し、湿布効果に優れています。
- 皮ふにやさしい弱酸性です。
- 伸縮性タイプの不織布で関節部位の貼付にも便利です。

△ 使用上の注意

してはいけないこと [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります]

次の部位には使用しないでください。
(1)目の周囲、粘膜等 (2)湿疹、かぶれ、傷口



■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

打撲、捻挫、筋肉痛、肩こり、腰痛、関節痛、しもやけ、筋肉疲労、骨折痛

用法・用量

表面のフィルムをはがして、1日1~2回患部に貼付してください。
必要な時は、包帯又はテープでとめてください。

用法・用量に関する注意

1. 定められた用法・用量を守ってください。
2. 体の表面に脂や汗がある場合は、よく拭き取ってから貼付してください。
3. 本剤に触れた手で、目、鼻腔、唇などの粘膜に触れないよう注意してください。
4. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督の下に使用させてください。

成分・分量

 (膏体 100g (1000cm²)中)

サリチル酸メチル …………… 1.0g
ℓ-メントール …………… 0.3g
dℓ-カンフル …………… 0.4g
トコフェロール酢酸エステル …… 0.2g

※添加物としてエデト酸Na水和物、カオリン、酸化チタン、CMC-Na、ジヒドロキシアリミニウムアミノアセテート、D-ソルビトール、グリセリン、酒石酸、ポリソルベート80、ポリビニルアルコール、ポリアクリル酸部分中和物、カルボキシビニルポリマー、ヒマシ油、香料を含有します。

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 使用後は、未使用分を袋に戻し、外気にふれないよう開封口のチャックをきちんと閉めて保管してください。
3. 小児の手の届かない所に保管してください。
4. 他の容器に入れ替えないでください。
[誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。]
5. 使用期限を過ぎたものは使用しないでください。
6. 開封後は、品質保持の点からなるべく早くご使用ください。

[包装] 32枚入
(8枚入×4袋 / 1枚: 10cm×14cm)

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

企画元 **株式会社ツルハグループアーマーチャンダイジング**

製造販売元

株式会社タカミツ

〒462-0803 名古屋市北区上飯田東町4の68の1

MADE IN JAPAN

※寸法イメージ図



お問い合わせ先: 株式会社タカミツ 電話0120-459533 (フリーダイヤル)
受付時間 (9:00~12:00、13:00~17:00 土・日・祝日を除く)



製造番号:
使用期限:

開
け
口