

切り口

切り口からゆっくり開封してください

切り口

開封後は、ファスナー部を合わせ保存してください

ロキソプロフェンNa水和物配合テープ剤

LOXOPROFEN

ロキソプロフェン



7枚入

テープ

1日1回 1日4枚まで

24時間  
効果が持続

患部に貼りやすい!  
3分割ライナー

伸ナタ  
縮ナテ  
メ・ヨ  
自在!  
コ

第2類医薬品 鎮痛消炎薬

販売名: ロキソプロフェンRテープ

関節痛

肩の痛み

つらい痛みの  
元に効く!

腰痛

セルフメディケーション  
税控除対象

切り口

切り口からゆっくり開封してください

切り口

開封後は、ファスナー部を合わせ保存してください

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

## ⚠ 使用上の注意

## ☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

## 1. 次の人は使用しないでください

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用してぜんそくを起こしたことがある人。
- (3)15才未満の小児。

## 2. 次の部位には使用しないでください

- (1)目の周囲、粘膜等。(2)いっしん、かぶれ、傷口。
- (3)みずむししたむし等又は化膿している部位。

## 3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないでください

4. 連続して2週間に以上使用しないでください  
(本剤は痛みを一時的におさえるのです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診療を受けてください。)

## ☒ 相談すること

## 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3)妊婦又は妊娠していると思われる人。(4)高齢者。(5)次の診断を受けた人。気管支ぜんそく

## 効能・効果

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

## 製造番号

## 使用期限

## 用法・用量

○表面のライナー(フィルム)をはがし、1日1回患部に貼付してください。  
○15才未満の小児は使用しないでください。  
○**使用方法**、用量に従事する注意>  
(1)用法・用量を厳守してください。(2)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。(3)1日あたり4枚を超えて使用しないでください。(4)汗をかいたり患部がぬれています時は、よく拭き取ってから使用してください。(5)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を自安として半日以上貼り、発疹・発赤・かゆみ・かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

製造 中央製薬株式会社

販売元 大阪市北区大通1-4-4

お客様相談窓口

☎ 06-7176-7519(代表)

受付時間 9:00~17:00  
(土日祝日を除く)

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤・かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱、青あざができる、色素沈着
消 化 器	胃部不快感、みぞおちの痛み
その 他	むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 使用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 下剤・軟便

4. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください(他の疾患の可能性があります)

## 成分・分量(膏体100g中) 1枚7cm×10cm、膏体量1g

ヨキソプロフェンナトリウム水和物···5.67g(無水物として5g)

添加物: (メントール)、ミリスチン酸イソブチロイル、BHT、タルク、ステレン・イソブレン・ステレンブロックポリマー、テルペン樹脂、流動パラフィン、その他2成分

## 保管及び取り扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(原用の原因になつたり品質が変わります)(4)品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、袋のファスナーをきちんと閉めて保管してください。(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、袋を開封した後は、なるべく早く使用してください。

使用開始日:

年 月 日

副作用被害救済制度

電話: 0120-149-931



01



4 595121 600087