

角丸・スリット付パップ剤

伸縮性

タテ、ヨコ のびる

ナビエース

うちみ

ねんざ

筋肉痛

第3類医薬品

肩こり

7枚入

ご使用後はファスナーを軽く押えて閉めてください。



切り取り線

ご使用後はファスナーを軽く押えて閉めてください。



切り取り線

鎮痛消炎パップ剤



△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないこと
(1)目の周囲、粘膜等、(2)湿疹、かぶれ、傷口。

⊠ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成分及び分量 膏体100.0g中

- dL-カンフル 0.200g
 - I-メントール 0.300g
 - サリチル酸グリコール 1.000g
 - トコフェロール酢酸エステル 0.300g
- 添加物として、D-ソルビトール液、濃グリセリン、ポリアクリル酸部分中和物、ゼラチン、カオリン、カルメロースナトリウム、酸化チタン、カルボキシビニルポリマー、アクリル酸デンプン、ポリソルベート80、pH調整剤、ジヒドロキシアルミニウム アミノアセテート、モノオレイン酸ソルビタンを含有します。

製造販売元 **TTC** 大協薬品工業株式会社
富山市水橋島等173

効能又は効果

打撲、捻挫、筋肉痛、肩こり、関節痛、骨折痛、腰痛、筋肉疲労

用法及び用量

1日1～2回、膏面のライナーを静かにはがし、そのままか、あるいは適当な大きさに切り患部に貼ってください。なお、必要に応じて、包帯、粘着テープ等で固定してください。

<用法及び用量に関連する注意>

- (1)用法及び用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。
- (4)多量の汗をかくことが予想される場合は、膏体がやわらかくなりすぎる可能性があるため、使用を控えてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)開封後はファスナーを開けて保管してください。
- (5)配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先 大協薬品工業株式会社



お客様相談窓口
電話:076-479-1313
受付時間 9:00～17:00(土、祝日を除く)

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931

7枚入 (12cm×7cm)
¥800+税 T11
品目番号 追7-74-461

配置期限

ロット番号