

Hapcool-G

第3類医薬品

うちみ・ねんざ・筋肉痛・肩こり・腰痛

ハップクールG

伸縮性

8枚入

角丸・スリット付パップ剤



↓切り取り線

ご使用後はファスナーを軽く押えて閉めてください。



↓切り取り線

ご使用後はファスナーを軽く押えて開けてください。

タテ、ヨコのびる

ハップクールG

(鎮痛消炎薬)

第3類医薬品



筋肉痛



肩こり



うちみ



ねんざ

配置期限

ロット番号

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

- (1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

⊗ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成分及び分量 膏体100g中

dl-カンフル	0.200g
l-メントール	0.300g
サリチル酸グリコール	1.000g
トコフェロール酢酸エステル	0.300g

添加物として、D-ソルビトール液、濃グリセリン、ポリアクリル酸部分中和物、ゼラチン、カオリン、カルメロースナトリウム、酸化チタン、カルボキシビニルポリマー、アクリル酸デンプン、ポリソルベート80、pH調整剤、ジヒドロキシアルミニウム アミノアセテート、モノオレイン酸ソルピタンを含有します。

製造販売元



大協薬品工業株式会社

富山市水橋路等173

効能又は効果

打撲、捻挫、筋肉痛、肩こり、関節痛、骨折痛、腰痛、筋肉疲労

用法及び用量

1日1～2回、膏面のライナーを静かにはがし、そのまま、あるいは適当な大きさに切り患部に貼ってください。なお必要に応じて、包帯、粘着テープ等で固定してください。

<用法及び用量に関連する注意>

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。
- (4) 多量の汗をかくことが予想される場合は、膏体がやわらかくなりすぎる可能性があるため、使用を控えてください。

[保管及び取扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 開封後はファスナーを開けて保管してください。
- (5) 配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

大協薬品工業株式会社

お客様相談窓口

電話：076-479-1313

受付時間 9:00～17:00

(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度

電話：0120-149-931



8枚入 (12cm×8cm)

¥900+税

T11