

タテ、ヨコ
のびる

フィットハップ[®]



うちみ・ねんざ・筋肉痛・肩こり・腰痛

伸縮性

6枚入

第3類医薬品

角丸・スリット付パップ剤



〔切り取り線〕残りの薬が乾燥しないように、折りまげて保管してください。

鎮痛消炎パップ剤



製造販売元
大協薬品工業株式会社
富山市水橋畠等173

副作用被害救済制度
電話: 0120-149-931 (フリーダイヤル)

配置期限

ロット番号

⚠ 使用上の注意

☒ [してはいけないこと]

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないこと

(1) 目の周囲、粘膜等。 (2) 温疹、かぶれ、傷口。

⚑ [相談すること]

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成分及び分量 膏体100g中

dl-カンフル	0.200g
l-メントール	0.300g
サリチル酸グリコール	1.000g
トコフェロール酢酸エステル	0.300g
添加物として、ローソルビトル液、濃グリセリン、ボリアクリル酸部分中和物、ゼラチン、カオリン、カルメロースナトリウム、酸化チタン、カルボキシビニルポリマー、アクリル酸デンプン、ポリソルベート80、pH調整剤、ジヒドロキシアルミニウム アミノアセテート、モノオレイン酸ソルビタンを含有します。	

効能又は効果

打撲、捻挫、筋肉痛、肩こり、関節痛、骨折痛、腰痛、筋肉疲労

用法及び用量

1日1~2回、膏面のライナーを静かにはがし、そのままかあるいは適当な大きさに切り患部に貼ってください。なお、必要に応じ、包帯、粘着テープ等で固定してください。

<用法及び用量に関する注意>

- (1)用法及び用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。
- (4)多量の汗をかくことが予想される場合は、膏体がやわらかくなりすぎる可能性があるので、使用を控えてください。

[保管及び取り扱い上の注意]

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (4)開封後は袋の口を折り上げて保管してください。
- (5)配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

大協薬品工業株式会社

お客様相談窓口

電話 076-479-1313

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

6枚入 (12cm×8cm)

¥700+税

