

こりと痛みに

第3類医薬品

ゴールドパスE



肩のこり・筋肉痛

ゴールドパスE

第3類医薬品

気孔付



キョクトウ株式会社

肩のこり・痛みに ゴールドパスE 鎮痛消炎薬 プラスター 気孔付 第3類医薬品 商品番号 74-565 12.10

効能又は効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

成分及び含量 1.0m²中 サリチル酸メチル…9.00g ノニル酸 γ -ニリルアミド…0.01g *l*-カンフル…1.80g ハッカ油…1.20g 1-メントール4.50g トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)…0.50g 添剤として、ポリブテン、生ゴム、ポリイソブチレン、エステルガム、テルペン樹脂、沈降炭酸カルシウム、酸化チタン、アクリル酸メチル、アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンニルフェニルエーテル、天然ゴムラテックス、香料、赤色405号、黄色205号を含有する。

鎮痛消炎薬 ゴールドパスE 第3類医薬品

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 1. 次の人は使用しないこと
天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2. 次の部位には使用しないこと
(1)目の周囲、粘膜炎等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。

⊗ 相談すること

- 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

- 3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

用法及び用量

1日1～2回、ライナーをはがし、患部に貼ってください。
(用法及び用量に関連する注意)

- (1)用法及び用量を厳守してください。(2)小児に使用される場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (4)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- (5)皮膚の弱い人は、使用前に顔の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。(6)皮膚の特に弱い人は、同じ部位に続けて貼らないでください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(鎮痛の原因になったり品質が変わります)。(4)開封後は袋の口を折り曲げ、外箱に入れて保管してください。(5)配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。

74mm×52mm 大判20枚入 ¥400+税



4 951079 882010

紙 : 箱 9ラ : 外装フィルム

キョクトウ株式会社

製造販売元 大協薬品工業株式会社
富山市水橋島等173

お客様相談窓口
電話:076-479-1313 (土、日、祝日を除く)
受付時間 9:00～17:00
副作用被害救済制度
電話:0120-149-931(フリーダイヤル)