

肩こり

腰痛

《貼り薬》サリエースA

第3類医薬品

■ **こり** と **痛み** を

緩和する消炎鎮痛プラスター

■ うす地でピッタリ

 中京医薬品

こり

第3類医薬品 サリエースA

《貼り薬》サリエースA 第3類医薬品

《貼り薬》
気孔付



ソフト
な貼り心地

32枚

[74mm×52mm]

肩こり

腰痛

こり

肩こり

腰痛



サリエースA

第3類医薬品

製造販売元 大協薬品工業株式会社
富山市水橋路番173

配置期限

ロット番号

T11



20202132

0202

サリエースA 第3類医薬品

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと
天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないこと
(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

用法及び用量

1日1～2回、ライナーをはがし、患部に貼ってください。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1)用法及び用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (4)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- (5)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (6)皮膚の特に弱い人は、同じ部位に続けて貼らないでください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)開封後は袋の口を折り曲げ、外箱に入れて保管してください。
- (5)配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。

74mm×52mm 大判32枚入 ¥500+税

副作用被害救済制度
電話:0120-149-931(フリーダイヤル)



(発売元)



株式会社 中京医薬品



世界の子供たちに健康と教育を

国際貢献活動を支援します

愛知県半田市亀崎北通町2-15-1 この商品の売り上げの一部は「あすなASSIST基金」に寄付されます。

効能又は効果

腰痛, 打撲, 捻挫, 肩こり,
関節痛, 筋肉痛, 筋肉疲労,
しもやけ, 骨折痛

成分及び分量

1㎡中 dl-カンフル…1.80g サリチル酸メチル…
9.00g ハッカ油…1.20g l-メントール…4.50g トコフェロール酢酸エス
テル(ビタミンE)…0.50g ノニル酸ワニリルアミド…0.01g 添加物と
して, ポリブテン, 生ゴム, ポリイソブチレン, エステルガム, テルペン
樹脂, 沈降炭酸カルシウム, 酸化チタン, アクリル酸メチル・アクリル酸-
2-エチルヘキシル共重合樹脂, ポリオキシエチレンノニルフェニルエー
テル, 天然ゴムラテックス, 香料, 赤色405号, 黄色205号を含有します。

お問い合わせ先 大協薬品工業株式会社 お客様相談窓口

電話：076-479-1313

受付時間 9：00～17：00(土, 日, 祝日を除く)