

こりと 気孔付 はりぐすり
痛みに

ここから開けてください



成分及び分量 1.0m²中
 クレタール...1.80g、シリチル酸メチル...9.00g、ハツジ油...1.20g、トコエロール酢酸エステル(ヒ
 タミンE)...0.50g、ニル酸のニルチン...0.01g、添物としてポリブチレンセbacryレート、エチルアクリル
 ルモノ、炭酸水素ナトリウム、酸化チタン、ポリブチレンセbacryレート、エチルアクリルモノ、炭酸水素ナトリ
 ム、ポリエチレン、スチレン、ポリブチレンセbacryレート、香料、着色剤、赤色409号、黄色409号を含有します。



セルフトレーシング
 税 控除 対象

第3類医薬品

気孔付 ビタミンE配合
ワイドパSE

TKL 大協薬品工業株式会社

気孔付 はりぐすり
 使用期限 製造番号



製造販売元 TKL 大協薬品工業株式会社
 〒173 東京都東大塚5-1-7
 電話：076-479-1313
 お客様相談窓口 受付時間 9:00~17:00 (土日、祝日を除く)



4 940794 442548

T21

この外箱は製品とともに保管し、使用の際には必ずお読みください。

外用鎮痛消炎薬 **ワイドパSE** 第3類医薬品

使用上の注意

- してはいけないこと**
 (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
 1. 次の人は使用しないこと
 天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 2. 次の部位には使用しないこと
 (1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。
- 相談すること**
 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- | 関係部位 | 症状 |
|------|--------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ、痛み |
3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能又は効果 腰痛、打撲(うちみ)、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労
 用法及び用量 1日1~2回、ライナーをはがし、患部に貼ってください。
用法及び用量に関連する注意
 (1) 用法及び用量を厳守してください。
 (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
 (3) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
 (4) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
 (5) 入浴時、温感成分による刺激を感じることがありますので、入浴の1時間前までには、はがしてください。
 (6) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
 (7) 皮膚の強い人は、同じ部位に続けて貼らないでください。
保管及び取扱い上の注意
 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
 (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
 (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
 (4) 開封後は袋の口を折り曲げ、外箱に入れて保管してください。
 (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
 副作用被害救済制度のお問い合わせ先 電話:0120-149-931 (フリーダイヤル)
 74mm×52mm 20枚入

0002-7826
 1
 TA90-99T