

血行を良くし、痛みをやわらげる

セルフメディケーション
税控除対象

肩こり・腰痛

関節痛・打撲・筋肉痛に

ハーフサイズ

温感

10cm
×7cm

身体の動きに
ピタッと密着!

伸縮
タイプ



ハーフサイズ
だから肩などに
貼りやすい!

弱酸性シップ薬

鎮痛・消炎温感パップ剤 第3類医薬品

NIDファーマシー・パップ(ホット)

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

鎮痛・消炎温感パップ剤 **温感** 第3類医薬品

NIDファーマシーパップ(ホット)

ハーフ
サイズ



【特徴】

- 鎮痛・消炎効果と温感作用をあわせもった弱酸性の温感パップ剤です。
- サリチル酸メチル、グリチルリチン酸などの鎮痛・消炎成分に、トウガラシエキスを配合していますので、患部の血行を良くし、心地よい温熱感で肩こり、腰痛などの痛みを緩和します。
- 粘着性にすぐれた基剤と伸縮性のある基布を使用していますので、ピッタリフィットします。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないこと

- (1) 目の周囲、粘膜等。 (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】 腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ

【用法・用量】 表面のプラスチックフィルムをはがし、患部に1日1~2回貼付する。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 打撲(うちみ)、捻挫には、はれがひいてから使用すること。

- (4) 汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用すること。
- (5) 本剤を貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないこと。
- (6) 本剤を貼ったまま、あるいは剥がした直後に入浴しないこと。
(強い刺激を感じることがあるので、少なくとも入浴の1時間前には剥がし、入浴後は30分位してから使用すること。)
- (7) 本剤に触れた手で、目の周囲、口唇、鼻孔、その他の粘膜にさわらないこと。
- (8) 皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないこと。
(使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用すること。)

【成分・分量】

本品膏体100g(875cm²)中
サリチル酸メチル 1.0 g グリチルリチン酸 0.03 g
dl-カンフル 0.5 g トウガラシエキス 0.22 g
(原生葉換算量2.75g)

添加物として、CMC-Na、D-ソルベitol、グリセリン、ポリアクリル酸部分中和物、ポリアクリル酸、エデト酸Na、カオリン、pH調節剤、その他3成分を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。未使用分はもとの袋に入れ、開封口のチャックをきちんと閉めて保管すること。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

【包装】

(1枚 : 10cm×7cm)

【販売名】NIDファーマシーパップ(ホット)

〈実物大〉

〈お問い合わせ先〉
本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。
帝國製薬株式会社 お客様相談室
電話 (0879)25-2363
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

帝國製薬株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地

ここを押して
開けて下さい。