

使用前にこの添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

〈鎮痒消炎薬〉

しっしん・皮膚炎・虫さされに

ペレトナルファ

第2類医薬品

- ◆皮膚病の症状はさまざまですが、その多くは激しいかゆみと炎症を伴います。かゆみは、かけばかくほどかゆくなり、また、かいてしまうことでなお、かゆみと炎症を悪化させてしまいます。ですから、治療の際大切なことは、出来るだけ早くかゆみを鎮めることです。
- ◆**ペレトナルファ**は皮膚の炎症をおさえるデキサメタゾン酢酸エステルに、かゆみをおさえるジブカイン塩酸塩、患部の痛みをとるサリチル酸メチル、患部のはれをとるグリチルレチン酸、患部に清涼感をもたらす l -メントール、 dl -カンフルを配合した外用クリーム剤です。これらの配合により、炎症に対する効果があり、かゆみをおさえ、その効果発現は速く、しっしん、皮膚炎などの皮膚病にご使用いただけます。また、最近多いハウスダニ等による、かゆみにも有効です。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 次の部位には使用しないでください。
水痘（水ぼうそう）、みずむし、たむし等又は化膿している患部
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください。
3. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 患部が広範囲の人
 - (5) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるの
で、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は
登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮 膚 (患 部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、 持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん


用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布または塗擦してください。


＜用法及び用量に関連する注意＞

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

●チューブの折り(尾)の部分から先端に向けて順に押し出してください。(①→②)



●チューブが破れて薬剤がとび出るおそれがあります。折り曲げないでください。折りたたまないでください。



成分・分量

(100 g 中)

成分	含量	はたらき
デキサメタゾン酢酸エステル	0.025 g	はれ・赤み等の炎症をおさえます。
ジブカイン塩酸塩	0.3 g	患部のかゆみをおさえます。
ジフェンヒドラミン	0.5 g	
グリチルレチン酸	0.5 g	患部の炎症を抑えます。
サリチル酸メチル	2.5 g	患部の痛みをしずめます。
ℓ-メントール	1.0 g	清涼感を与え、かゆみをしずめます。
dl-カンフル	1.5 g	

添加物として、ポリソルベート60、パラベン、ステアリルアルコール、白色ワセリンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。)

本品についてのお問い合わせは
お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

万協製薬株式会社

電話 0598-37-2088

受付時間 AM10:00~PM5:00

(ただし、土、日、祝祭日を除きます。)



発売元

日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木3-46-16

<http://www.nippo-yakuhin.jp/>

製造販売元



万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂1169-142