

第②類医薬品

かゆみ・虫さされに

# カユミーナローション

鎮痒消炎薬

## カユミーナローションの特徴

- ・液体タイプで、スーッとこちよい清涼感を与えます。
- ・首の部分が曲がっていて、スポンジがピッタリと接しますので、背中や腰などの塗りにくい患部にもスムーズにむらなく適量を塗布できます。
- ・かゆみや炎症を抑える成分として、デキサメタゾン酢酸エステル、ジフェンヒドラミン塩酸塩を配合しています。
- ・かゆみを抑える成分として、*l*-メントール、*dl*-カンフルを配合しています。
- ・殺菌作用のある成分として、イソプロピルメチルフェノールを配合しています。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

〈守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります〉

1. 次の部位には使用しないでください。
  - (1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部
  - (2)目の周囲、粘膜等
2. 顔面には広範囲に使用しないでください。
3. 長期連用しないでください。



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1)医師の治療を受けている人
  - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (4)患部が広範囲の人
  - (5)湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位   | 症 状                           |
|--------|-------------------------------|
| 皮 膚    | 発疹・発赤、かゆみ、はれ                  |
| 皮膚(患部) | みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感 |

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## \*効能・効果

かゆみ、虫さされ、かぶれ、あせも、じんましん、湿疹、皮膚炎、しもやけ


|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  |  |  |  |
| かゆみ   | 虫さされ  | かぶれ、湿疹  | あせも  |

## 用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

### <用法・用量に関連する注意>

- 定められた用法・用量をお守りください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 使用する際は、スポンジ部分をゆっくり患部に数回押し当て、スポンジに薬液を十分しみ込ませてから塗布してください。(スポンジ面に薬液が十分しみ込んでいない状態で使用すると、スポンジが破損する場合があります。)また、スポンジ面に薬液をしみ込ませても、強く押し当てたまま塗布しますと、スポンジが破損する原因になりますのでご注意ください。
- 患部を搔かないでください。本剤にはアルコールが含有されているため、塗布した時にしみる場合があります。
- 本剤のついた手で、目など粘膜にふれないでください。
- 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。



## 成分・分量

| 成分             | 含量<br>(100g中) | はたらき                                |
|----------------|---------------|-------------------------------------|
| デキサメタゾン酢酸エステル  | 0.025g        | 炎症を抑え、はれ・赤み等の症状を改善します。              |
| ジフェンヒドラミン塩酸塩   | 1.0g          | 抗ヒスタミン作用により、虫さされ等に伴うかゆみや炎症を抑えます。    |
| イソプロピルメチルフェノール | 0.1g          | 患部に対する殺菌作用があります。                    |
| l-メントール        | 3.0g          | 鎮痛作用を有し、清涼感のある刺激作用により痛みやかゆみをやわらげます。 |
| dl-カンフル        | 2.0g          |                                     |

添加物として、グリセリン、ヒドロキシプロピルセルロース、アジピン酸ジイソプロピル、クエン酸、クエン酸Na、イソプロパノール、エタノールを含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- 使用後は、速やかにキャップを十分に閉めて、直射日光の当たらない涼しい所に立てて保管してください。(保管方法を守らないと、塗布部のスポンジ破損の原因になったり、液漏れにつながる恐れがあります。)
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- 火気に近づけないでください。
- 時計、めがね等の金属類、化学繊維の衣類、プラスチック類、塗装のしてある床・家具等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- 衣類に付着した場合は、なるべく早く水又は洗剤で洗ってください。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



### 製品についてのお問い合わせ

- ・お買い求めの販売店
- ・ジャパンメディック株式会社 お客様相談窓口：076-438-1107  
〔受付時間：月～金（祝祭日・年末年始を除く）9:00～17:00〕

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元

ジャパンメディック株式会社  
富山県富山市横越168