

この説明文書は、本剤を使用する前に必ずよくお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

かゆみ・虫さされに  
**ハイカムミール**ジェル  
鎮痒消炎剤

特 徴

1. リドカインの局所麻酔作用、*l*-メントールと*dl*-カンフルの局所刺激作用及びクロタミトンの鎮痒作用によりかゆみを鎮め、ジフェンヒドラミンの抗ヒスタミン作用により、かゆみをもとから抑えます。
2. さわやかな使用感：透明なゲル状の軟膏剤で、のびがよく、べとつきません。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (3) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能又は効果

かゆみ、虫さされ、皮ふ炎、湿疹、じんましん、かぶれ、あせも、ただれ、しもやけ



－裏面も必ずお読みください－

## 用法及び用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

### 〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量をお守りください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (4) 患部を掻かないでください。本剤にはアルコールが含有されているため、塗布した時にしみる場合があります。
- (5) 本剤のついた手で、目など粘膜にふれないでください。
- (6) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

## 成分及び分量

成分	分量(100g中)	作用
ジフェンヒドラミン	1.0 g	抗ヒスタミン作用により、虫さされ等に伴うかゆみや炎症を抑えます。
リドカイン	2.0 g	局所麻酔成分で、知覚神経を麻痺させ患部のかゆみを鎮めます。
クロタミトン	5.0 g	湿疹、虫さされ等に伴うかゆみを抑えます。
<i>l</i> -メントール	3.0 g	鎮痛作用を有し清涼感のある刺激作用により痛みやかゆみをやわらげます。
<i>d</i> -カンフル	2.0 g	

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、カルボキシビニルポリマー、1,3-ブチレングリコール、イソプロパノール、アジピン酸ジイソプロピル、エタノールを含有します。

## 保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 時計、めがね等の金属類、化学繊維の衣類、プラスチック類、塗装のしてある床・家具等に付着すると、変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (5) 火気に近づけないでください。
- (6) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

### 製品についてのお問い合わせ

・お買い求めの販売店  
・ジャパンメディック株式会社 お客様相談窓口：076-438-1107  
〔受付時間：月～金（祝祭日・年末年始を除く）9:00～17:00〕

副作用被害救済制度の問合せ先  
（独）医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

製造販売元

**ジャパンメディック株式会社**

富山県富山市横越168