

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

虫さされ・かゆみ用薬

第2類医薬品

# ラスキーヌA

○ラスキーヌAは虫さされ、それに伴ういたみ・かゆみの緩和を目的としたアンモニア水配合の軟膏剤です。

1. 従来アンモニア水として使用してきたものを軟膏剤に配合してあります。
2. アンモニア水（毒物の中和）の他にリドカイン（鎮痛）、ジフェンヒドラミン（鎮痒）及び1-メントール（鎮痛鎮痒）を配合することにより、相乗効果を発揮します。



## 使用上の注意

### してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 次の部位には使用しないで下さい  
(1) 口唇等の粘膜部や目の周囲。  
(2) 傷、ただれ、かぶれのある所。
2. ガーゼや脱脂綿に浸して患部に貼り付けしないで下さい

### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、灼熱感

3. 5～6回使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

## 効能・効果

虫さされ、虫さされによるいたみおよびかゆみ止め

## 用法・用量

虫さされ後、出来るだけ早く、適量を塗布又は擦り込んで下さい。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3) 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科専門医の診療を受けて下さい。
- (4) 本剤は外用にのみ使用して下さい。

## 成分・分量

100 g 中

成分	分量
アンモニア水	15mL
リドカイン	0.50 g
ジフェンヒドラミン	0.50 g
l-メントール	1.00 g

添加物：白色ワセリン、セタノール、ミリスチン酸イソプロピル、ポリソルベート60、自己乳化型モノステアリン酸グリセリン、プロピレングリコール

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口：協和薬品工業株式会社 お客様相談室

フリーダイヤル 0120-468771

受付時間 9:00～12:00・13:00～17:00

(土、日、祝日を除く)

発売元 **協和薬品工業株式会社**

営業本部：岐阜県岐阜市野一色2丁目8番6号

製造販売元 **前田薬品工業株式会社**

富山県富山市向新庄町一丁目18番47号