

温感タイプ

腰痛・うちみ・肩こり・筋肉痛に 15枚入 (5枚×3袋入)

消炎・鎮痛・生薬入パップ剤

月神仙 ゲルホット

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと。
 - (1) 目の周囲、粘膜等。
 - (2) しっしん、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること。
 - (1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (2) 薬によりアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談すること。
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状 |
|------|---------------------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ等、とくに強いかゆみや痛み |

- (2) 5~6日間使用しても症状がよくなる場合

成分・分量 薬品100g中(1枚12g)

| | |
|---------------------|------------------|
| オウバク末.....2.0g | l-メントール.....0.5g |
| トウガラシエキス.....0.06g* | dl-カンフル.....0.3g |
| サリチル酸メチル.....0.5g | *原生薬換算量 3.0g |

添加物:ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、パラベン、デヒドロ酢酸Na、酸化チタン、カオリン、CMC-Na、グリセリン、D-ソルビトール、ケイ酸アルミン酸Mg、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、ポリオキシエチレンセチルエーテル

効能・効果

腰痛、肩こり、筋肉痛、筋肉疲労、関節痛、打撲、捻挫、骨折痛、しもやけ

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

特 長

- 生薬成分<オウバク末>による消炎鎮痛効果と、トウガラシエキスの配合による温感効果を合わせもち、慢性的な腰痛、肩こり等にすぐれた効果を発揮します。
- 伸縮布を使用していますので、関節部や筋肉の動きにぴったりフィットし、ひじ、ひざ、足首などのはがれやすい部位にも大変効果的です。
- 粘着力が強く、しかも肌にやさしいパップ剤です。

用法・用量

1. 薬剤面のフィルムをはがし、そのまま患部に貼り、紙テープで止めるか、包帯をしてください。
 2. 1日1~2回貼ってください。
- <用法・用量に関連する注意>
- (1) 定められた用法・用量をお守りください。
 - (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
 - (3) 本剤を貼ってから汗をかくと刺激を感じますから、汗をかきそうな作業やスポーツを行う前には貼らないでください。
 - (4) 本剤に触れた手で、目、口唇、鼻孔、その他の粘膜にさわらないでください。
 - (5) 皮ふの弱い方は、本剤を同じところに貼り続けしないでください。
 - (6) とくに皮ふが弱くて、かぶれやすい方は、使用前に腕の内側に小片を貼り、発疹・発赤、かゆみ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
 - (7) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
 - (8) 本剤を貼ったまま、あるいははがした直後に入浴すると、強い刺激を感じることがありますので、少なくとも入浴の1時間前にははがしてください。また、入浴後は30分位してから使用してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (2) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 未使用分は袋に入れ、チャックを締めて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。
- (6) 衣類に付着すると黄色に着色することがあります。
- (7) 本品は、生薬<オウバク末>を含んでいますのでまれに色調が異なることがあります。効果にかわりありません。

※帯状疱疹 本剤の使用中に痛みをとまなう赤味を帯びた米粒大の水疱があらわれた場合には、ウイルスによる帯状疱疹であることが多く、副作用と間違えられることがあります。このような場合には使用を中止して、皮膚科専門医の診療を受けてください。

【お問い合わせ先】

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室
電話:03-3370-7174(代表)
受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

【副作用被害救済制度のお問い合わせ先】

(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)



発売元
日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3丁目4番16号
<http://www.nihon-yakuhin.jp/>



製造販売元
東光薬品工業株式会社
東京都足立区新田2丁目16番23号