

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

コザックガード®

水虫治療薬

第2類医薬品

販売名：コザックガード

コザックガードは、水虫の原因菌(白せん菌)に対してすぐれた抗菌作用を発揮するトルナフタート配合の水虫治療薬です。

塗布部位に薄い被膜をつくり、薬剤が患部によくとどまります。

【使用上の注意】



してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

次の部位には使用しないでください。

- (1)目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等。
- (2)湿疹。
- (3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)乳幼児。
- (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4)患部が顔面又は広範囲の人。
- (5)患部が化膿している人。
- (6)「湿疹」か「みずむし、いんぎんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。
(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等其他の原因による場合が多い。)

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感

3. 2週間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成 分】 (1mL中)

成 分	分量	はたらき
トルナフタート	20 mg	水虫の原因菌(白せん菌)に対してすぐれた抗菌作用を発揮します。
フタル酸ジエチル	250 mg	角質溶解剤の一種で、有効成分の浸透性を高めます。
グリチルレチン酸	5 mg	抗炎症、抗アレルギー作用等により患部の炎症を抑えます。
ジブカイン塩酸塩	2 mg	患部の痛みやかゆみを抑えます。

添加物としてアルコール、イソプロパノール、エドト酸Na、ジブチルヒドロキシルエン、ヒドロキシプロピルセルロース、メチルエチルケトン含有します。

【効能・効果】

みずむし、ぜにたむし、
いんきんたむし。

【用法・用量】

1日1～4回、適量を患部に
塗布してください。

「いんきんたむし」は、
主として、足のつけ根・太も
もの内側に白せん菌が感
染し、発症する疾患です。
まれに、陰のう部にも感染
することがあります。



陰のう部の疾患には
本剤は使用できませんので、医師、薬剤
師又は登録販売者に
相談してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)外用にのみ使用してください。


コザックガード 容器のご使用方法

- ご使用の都度、図1のように容器を上に向け、先端を手の指などで1～2度空押しして、中の空気を抜いてください。気温や手の体温などで容器が温まると、容器内の圧力が高まって、ご使用時に液が多く出る場合があります、これを防ぐためです。
- ご使用に際しては、図2のように容器を下に向け、先端を患部に軽く押しあてて塗布してください。

●ご使用前



●ご使用中



保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光のあたらない涼しい所に密栓して箱に入れ、容器を立てた状態で保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)火気に近づけないでください。
- (5)使用済みの容器は、火中に投じないでください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。
- (7)合成樹脂(スチロールなど)を軟化したり、塗料を溶かすことがありますので、メガネの枠、塗装家具、床(フローリングなど)等につかないようにしてください。

問い合わせ先

- 1) お買い求めのお店
- 2) 全薬工業お客様相談室
住 所：〒112-8650 東京都文京区大塚5-6-15
電 話：03 (3946) 3610
受付時間：9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)



製造販売元 **全薬工業株式会社**
東京都文京区大塚5-6-15